四庫全書

子部

欽定四庫全書

子部

景岳全書卷五十四

詳校官太醫院醫士臣舒岱

編修臣倉聖脈覆勘

總校官原任中允臣王燕緒

校對官原任編修臣勵守謙

謄録貢生臣黄嵩齡

景岳全書卷五十四

明 張介賓 撰

和陣

二陳湯一 局方 治痰飲嘔惡風寒欬嗽或頭眩心悸或中脘不快或因生冷或飲酒過多脾胃不和等證

陳皮 半夏制各三錢 茯苓三錢 炙甘草一錢

水二鍾薑三五片棗一枚煎八分食遠服

加減二陳湯二　治嘔吐吞酸胃脘痛呃逆

即前方加丁香九粒氣滯甚者可加一二錢

丹溪加味二陳湯三　治食鬱痰滯胸膈不快

蒼术米泔浸　白术炒　橘紅　半夏泡

茯苓　川芎　香附各八分　枳殻

黄連薑炒　甘草各五分

水盞半煎八分食前稍熱服

二术二陳湯四　治一切嘔吐清水如注

蒼朮土炒　白朮炒　陳皮　半夏制

茯苓各一錢　炙甘草五分

水一鍾半薑三片棗一枚煎八分稍熱服○虛寒者

加人參煨乾薑○痰飲加南星倍半夏○宿食加神

麯砂仁

黃芩二陳湯五　治熱痰宣明

黃芩　陳皮　半夏　茯苓等分

甘草減半

水一鍾半薑三片煎七分食遠服

辨疑柴葛二陳湯六 治一切瘧暑濕勞食等證

柴胡 乾葛 陳皮 半夏

茯苓 甘草 白朮 蒼朮製

川芎 黄芩各等分若陰瘧除此味

水二鍾薑三片煎服○内乾葛川芎蒼朮乃發散之劑若久瘧及發散過者除之○陽分汗多加人參黄芪去乾葛○陰分虚者加酒炒芍藥當歸生地○

久瘧微邪潮熱加四君子湯去祛邪之藥○若欲截瘧加常山梹榔青皮貝母各一錢

桂附二陳湯七　方在熱陣百十五

治寒瘧厥冷

金匱小半夏湯八　治嘔吐穀不得下及心下有飲者

半夏一升　生薑半斤

右二味以水七升煮取一升半分温再服○局方用半夏五錢生薑二錢半水一鍾半煎服

金匱小半夏加茯苓湯九　治卒嘔吐心下痞膈間有水眩悸者即前方加茯苓三兩煎法同

金匱大半夏湯十　治胃反不受食食入即吐○外臺云治嘔而心下痞鞕者

半夏二升洗完用　人參三兩　白蜜一斤

右三味以水一斗二升和蜜揚之二百四十遍煮藥取二升半溫服一升餘分再服

御藥大半夏湯十一　一名橘皮湯　治痰飲及脾胃不和

半夏　陳皮　白茯苓各二錢

水二鍾薑五片煎八分溫服

茯苓半夏湯十二　治嘔吐噦心下堅痞膈間有水痰眩驚悸及小兒等病

白茯苓二兩　半夏五錢

右每服三五七錢薑水煎服

宣明橘皮半夏湯十三　治痰涎壅嗽久不已者常服潤燥解肌熱止嗽

陳皮五錢　半夏製二錢半

水一鍾半加生薑三五片煎七分溫服

靈樞秫米半夏湯十四　久病不寐者神效世醫解用之

秫米一升　半夏五合

右用千里長流水八升揚之萬遍取清者五升煮秫米半夏炊以葦薪令竭至一升半去渣飲汁一小杯日三服其新病者覆杯即卧汗之即已久病者三日而已也

東垣 半夏白朮天麻湯十五 治眩暈及足太陰痰厥頭疼

半夏錢半 白朮 神曲炒各一錢 麥芽

陳皮各錢半 人參 黄芪 茯苓

蒼朮 天麻 澤瀉各五分 黄柏二分

乾薑三分

右㕮咀每服半兩水二鍾煎八分食遠熱服

金匱 黄芩半夏生薑湯十六 治乾嘔而利者

黄芩　生薑各三兩　炙甘草　芍藥各二兩

半夏半升　大棗十二箇

右六味以水一斗煮取三升去滓温服一升日再夜一服

東垣平胃散十七　治脾胃不和不思飲食心腹脇肋脹滿刺痛嘔噦惡心吞酸噫氣體重節痛自利霍亂噎膈反胃等證

厚朴薑製炒　陳皮去白各五兩　蒼术去皮米泔浸炒八兩　炙甘草

三兩

本方加人參茯苓各二兩即名參苓平胃散

右為末每服二錢水一鍾薑三片棗二枚煎七分去渣溫服○或去薑棗入鹽一小撚單以沸湯點服亦可○如小便不利加茯苓澤瀉○如飲食不化加神麯麥芽枳實○如胃中氣痛加木香枳實或枳殼○如脾胃困倦加人參黃芪○如有痰加半夏○如便鞕腹脹加大黃芒硝○如脉大內熱加黃連黃芩○

調氣平胃散十八　治胃氣不和脹滿腹痛

厚朴製　陳皮　木香　烏藥

白豆蔻　砂仁　白檀香各一錢　甘草五分

蒼术錢半　藿香一錢二分

水一鍾半生薑三片煎八分食遠溫服

錢氏益黃散十九　治脾土虛寒寒水反來侮上而嘔吐不食肚腹作痛或大便不實手足逆冷等證

陳皮一兩　青皮　訶子肉炮去皮　炙甘草各

半兩　丁香二錢

右每服四錢水煎服

藿香正氣散二十　治外感風寒內停飲食頭疼寒熱或霍亂泄瀉痞滿嘔逆及四時不正之氣瘧痢傷寒等證

藿香　紫蘇　桔梗　白芷

大腹皮各一錢　陳皮　半夏　茯苓

甘草　白朮　厚朴各八分

水二鍾薑三片棗一枚煎八分熱服取汗

不換金正氣散 二一 治脾氣虛弱寒邪相搏痰停胸膈致發寒熱或作瘧疾或受山嵐瘴氣等毒

厚朴薑製　藿香　半夏　蒼朮米泔浸

陳皮各一錢　甘草炙五分

薑棗水煎服

陳氏不換金正氣散 二二 治感冒風寒或傷生冷或瘴瘧或疫癘

蒼朮米泔浸炒　厚朴薑汁炒各四兩　橘紅三兩　炙甘草

半夏製　藿香各二兩　人參　木香濕紙裹煨

白茯苓各一兩

右每服一兩薑棗水煎服

徐氏正氣散二三　正胃氣進飲食退寒瘧瘴氣脾胃滯者用之為宜

藿香　草果各二兩　半夏製　陳皮

厚朴　砂仁　炙甘草各一兩

右為末每服三錢加生薑七片棗三枚同煎俟瘧未發前和渣服

濟生大正氣散二四治脾胃不和為風寒濕氣所傷心腹脹悶有妨飲食

白术　陳皮各二錢　半夏製　藿香葉

厚朴薑炒　桂枝　枳殼　檳榔

乾薑炮各錢　甘草炙五分

水一鍾半薑三片棗一枚煎七分不時温服

東垣升陽益胃湯二五　治秋燥令行濕熱少退脾胃虛弱怠惰嗜卧體重節痛四肢不收口苦舌乾飲食不消大便不調小便頻數兼見肺病洒淅惡寒慘慘不樂面色惡而不和乃陽氣不伸故也當升陽益胃○良方無黃芪甘草半夏芍藥四味

人參　炙甘草　半夏脉澀者宜用各一錢　黃芪二錢　白术三分　白芍　防風　羌活　獨活各五分　柴胡　茯苓小便利者勿用　澤瀉不淋者勿

用各三分 陳皮四分 黄連二分

右㕮咀每服三錢漸加至五錢生薑五片棗二枚水三鍾煎一鍾早飯午飯之閒温服忌語話一二時及酒濕助火之物○服藥後如小便畢而病反增是不宜利小便也當去茯苓澤瀉若得喜食增食初一二日間不可太飽恐藥力尚淺胃氣再傷不得轉運也或用美食以助藥力而滋胃氣慎不可淡食以損藥力而助邪氣之沉降也亦可小役形體使胃氣升發

切勿大勞致令復傷但以胃氣安靜爲尤善

海藏白术湯二六 治風濕惡寒脉緩

白术　防風　甘草

右㕮咀加生薑煎服

濟生白术湯二七 治五臟受濕欬嗽痰多氣喘身重脉濡細

白术　橘紅　半夏　茯苓各二錢

炙甘草一錢

水一鍾半薑五片煎七分食遠服

二味白术湯二八　方在婦人十二
良方

治妊娠内熱心痛

四味白术湯二九　方在婦人十三
良方

治妊娠胃虚惡阻

白术散三十　治自汗盗汗極效

白术半斤

右將白术切成小塊用浮麥一升水一斗同煮乾如

白术尚硬再加水煮透爛取起切片焙乾為末每服二三錢仍用浮麥煎湯食遠調服〇如治小兒以炒黃芪煎湯量兒大小與服〇忌蘿蔔辛辣炙煿之物乳母尤忌

宣明 白术散 三一 方在固陣三

治虛風多汗痿弱

良方 白术散 三二 方在婦人十一

治妊娠傷寒內熱等證

調胃白术散三三　治脾胃不和腹脹泄瀉身面浮腫

白术　茯苓各二錢　陳皮　白芍藥炒

澤瀉　檳榔各一錢　木香五分

水二鍾薑三片煎八分食遠服○如腫不退倍加白

术并枳實麩炒一錢

白术芍藥湯三四　治脾經受濕水泄體重微滿困弱

無力不欲飲食或暴泄無數水穀不化宜此和之

白术炒　芍藥炒各一兩　甘草炒半兩

右每用一兩水煎服

草窓白术芍藥散 三五 治痛瀉要方

白术 炒三兩 芍藥 炒二兩 陳皮 炒兩半 防風 一兩

右或煎或丸或散皆可用久瀉者加炒升麻六錢

金匱苓桂朮甘草湯 三六 病痰飲者當以溫藥和之凡心下有痰飲胸脇支滿目眩此方主之

茯苓 四兩 桂枝 白术 各三兩 甘草 二兩

右以水六升煮取三升溫分三服小便則利

神术散 三七 治傷寒頭痛身熱等證

蒼术二錢 川芎 藁本 甘草各一錢

水二鍾薑三片煎一鍾不拘時服

局方神术散 三八 方在散陣六五

治四時瘟疫頭疼發熱

海藏神术散 三九 治風濕惡寒脉緊

蒼术 防風 甘草

右㕮咀加葱白煎服○治剛痓無汗者加羌活或獨

活麻黃

約說沉香降氣散 四十 治陰陽壅滯氣不升降胸膈痞塞或留飲吞酸脇下妨悶

沉香二錢八分 砂仁七錢半 香附子去毛鹽水炒六兩二錢五分

炙甘草五錢五分

右為極細末每服二錢入鹽少許沸湯調不拘時服或淡薑湯亦可

和劑蘇子降氣湯 四一 治心腹脹滿喘促氣急消痰進

食

蘇子炒　半夏麯　前胡　當歸

陳皮　厚朴製各八分　桂枝　甘草各三分

水二鍾薑三片煎七分不拘時服

醫林小降氣湯四一　治濁氣在上痰涎壅盛

家紫蘇　台烏藥　白芍　陳皮各二錢

炙甘草五分

水一鍾半生薑三片棗一枚煎七分食遠服

統旨木香順氣散 四三 治氣滯腹痛脇痛

木香 香附 檳榔 青皮

陳皮 枳殼 砂仁 厚朴製

蒼术各一錢 炙甘草五分

水二鍾薑三片煎八分食遠服

局方木香調氣散 四四

木香 白檀香 白豆蔻 丁香各二錢

炙甘草 藿香各八錢 砂仁四錢

右為末每服二錢入鹽少許沸湯點服

流氣飲子 四五 治三焦氣壅五臟不和胸膈痞滿肩背攻痛嘔吐氣喘痰盛浮腫等證○即外科方脉流氣飲

木香 磨汁 梹榔 青皮 陳皮

枳殻 烏藥 大腹皮 枳實

茯苓 紫蘇 桔梗 防風

黄芪 當歸 川芎 芍藥

甘草　半夏制各等分

右一鍾半薑三片棗一枚煎服

和劑二十四味流氣飲四方　調營衛利三焦行痞滯消腫脹

紫蘇　陳皮　青皮　厚朴製

炙甘草　香附炒各四兩　木通二兩　大腹皮

丁香皮　檳榔　肉桂　木香

草果　莪朮炮　藿香各一兩半　麥冬

人參　白朮　赤茯苓　木瓜

白芷　半夏　枳殻　石菖蒲各一兩

右每服三錢薑四片棗二枚水煎服

七氣湯四七　治七情之氣鬱結於中心腹絞痛不可忍及不能飲食

半夏製五兩　人參　肉桂　甘草炙各一兩

右每服三五錢水一鍾半薑三片煎八分服

七氣湯四八　治如前　按此方即局方四七湯也三因

在後九七

半夏五兩製 茯苓四兩 厚朴三兩 紫蘇二兩

右每服三五錢薑七片棗二枚水煎服

加味七氣湯四九

即前七氣湯加厚朴茯苓各等分

局方七氣湯五十 治七情鬱結臓氣互相刑尅隂陽不和揮霍撩亂吐瀉交作

半夏製 厚朴 芍藥 茯苓各二錢

人參 肉桂 橘紅 紫蘇各一錢

水二鍾加薑棗煎服

指迷七氣湯五一　治七情相干陰陽不得升降氣道壅滯攻衝作疼積聚癥瘕脹滿等證

半夏　甘草各七分半　香附錢半　青皮

陳皮　桔梗　官桂　藿香

益智　莪朮煨各一錢

右每服三五錢薑三片棗一枚水煎服○統旨七氣湯有三稜玄胡索薑黃草豆蔻無半夏桔梗○濟生

大七氣湯有三稜無半夏

四磨飲 五二 治諸逆氣

沉香　烏藥　枳實　檳榔

右四味用白湯共磨服或下養正丹尤佳○一方用白酒磨○濟生方用人參無枳實○本方加木香即名五磨飲

濟生疏鑿飲 五三 治水氣通身浮腫喘呼氣急煩渴大小便不利

澤瀉　茯苓皮　木通　商陸

大腹皮　檳榔　羌活去蘆　秦艽去蘆

椒目　赤小豆炒

右㕮咀每服六七錢水一鍾半薑五片煎服

良方厚朴湯四五　治心腹脹滿此病氣壅實者之治法也

厚朴四五錢薑汁炒

加生薑五七片水煎温服○或間用沉香降氣散

木香寬中散 五五 治七情傷於脾胃以致胸膈痞滿停痰氣逆或成五膈之病

青皮 陳皮 丁香各四兩 厚朴製一斤 甘草炙五兩 白豆蔻二兩 香附炒 砂仁 木香各三兩

右為末每服二錢薑鹽湯調服○若脾胃虛損之證不可過服或與六君子兼用之

良方 木香分氣飲 五六 治氣滯留注四肢腹急中滿胸

膈脇肋膨脹虚氣上衝小便臭濁

木香　猪苓　澤瀉　赤茯苓

半夏　枳殻　檳榔　燈草

蘇子等分

右㕮咀每服一兩水一鍾半煎八分入麝香末少許

食遠服

良方人參木香散五七　治水氣病

人參　木香　茯苓　滑石

琥珀　海金沙　枳殼　檳榔

猪苓　甘草等分

右㕮咀每服一兩生薑三片水一鍾半煎七分日進

三服不拘時

消導寬中湯五分　治氣滯食滯水腫脹滿

白朮一錢半　枳實麩炒　厚朴薑製　陳皮

半夏　茯苓　山查　神麯炒

麥芽炒　蘿蔔子炒各一錢

水一鍾半薑三片煎八分食遠服○小便不利加猪苓澤瀉

化滯調中湯五九 治食滯脹滿

白朮錢半 人參 白茯苓 陳皮

厚朴薑汁炒 山查 半夏各一錢 神麯炒

麥芽炒各八分 砂仁七分

水一鍾半薑三片煎七分食前服○脹甚者加蘿蔔子炒用一錢麩食傷者尤宜用

索矩三和湯六十　治脾濕腫滿

陳皮　厚朴薑炒　白朮　檳榔各一錢

紫蘇七分　海金沙　木通各五分

水一鍾半薑三片棗一枚煎七分食遠服

寶鑑導滯通經湯六一　治脾濕氣不宣通面目手足浮

腫

木香　白朮　桑白皮　陳皮各五錢

茯苓一兩

右㕮咀每服七八錢水一鍾半煎八分食前温服

良方導水茯苓湯六二　治水腫頭面手足徧身腫如爛瓜之狀按而塌陷胸腹喘滿不能轉側安睡飲食不下小便秘濇溺出如割或如黑豆汁而絶少服喘嗽氣逆諸藥不效者用此即漸利而愈

赤茯苓　麥門冬去心　澤瀉　白术各三兩

桑白皮　紫蘇　檳榔　木瓜各一兩

大腹皮　陳皮　砂仁　木香各七錢半

右㕮咀每服一二兩水二鍾燈草三十根煎八分食前服○如病重者可用藥五兩再倍加麥冬及燈草半兩以水一斗於砂鍋內熬至一大碗再下小銚內煎至一鍾五更空心服柤再煎連進此三服自然小水通利一日添如一日

健脾散六三 和中健胃消食快氣

人參 白朮炒 丁香 藿香

砂仁炒 肉果煨 神麯炒 炙甘草等分

右為細末每服二錢不拘時橘皮湯下

參朮健脾湯六四 治脾虛兼滯脹滿

人參　白茯苓　陳皮　半夏

砂仁　厚朴薑製各一錢　白朮二錢　甘草三分

水一鍾半薑三片煎七分食遠服○加神麴麥芽山查消脹尤佳

當歸散三因六五 水腫之疾多由火不養土土不制水故水氣盈溢脉道閉塞滲透經絡發為浮腫心腹脹

脹滿之證

當歸　桂心　木香　赤茯苓

木通　梹榔　赤芍藥　牡丹皮

陳皮　白朮各一錢半　木瓜一斤

水二鍾加紫蘇五葉煎八分不拘時服

當歸活血散六六　治瘀血脹滿

赤芍藥　歸尾酒洗　生地黃各錢半　桃仁去皮尖炒

紅花酒洗　香附童便浸各一錢　川芎　牡丹皮

玄胡索　蓬朮炮各八分　三稜炮　青皮各七分

水一鍾半煎七分食前服

局方五皮散六七　治風濕客於脾經以致面目虛浮四肢腫滿心腹膨脹上氣急促兼治皮水胎水

五加皮　地骨皮　大腹皮　茯苓皮

生薑皮等分

右㕮咀每服三錢水一大鍾煎七分熱服無時

澹寮五皮散六八　治病後身面四肢浮腫小便不利脈

虛而大此由諸氣不能運行散漫於皮膚肌腠之間故令腫滿此藥最宜

大腹皮　陳皮　生薑皮　桑白皮炒

赤茯苓皮各等分

右㕮咀每服五六錢水一大鍾煎八分不拘時溫服日三次忌生冷油膩堅硬之物

沉香琥珀丸六九　治水腫一切小便不通難治之證

沉香　郁李仁去皮　葶藶炒各一兩半　琥珀

杏仁去皮尖　紫蘇　赤茯苓　澤瀉各半兩

橘紅　防巳各七錢半

右為細末煉蜜丸梧子大以麝香為衣每服二十五

丸漸加至五七十丸空心人參湯送下量虛實增減

法製陳皮七十　消食化氣寛利胸膈美進飲食

茴香炒　甘草炙各二兩　青鹽炒一兩　乾薑

烏梅肉各半兩　白檀香二錢半

右六味共為末外以廣陳皮半斤湯浸去白淨取四

兩切作細條子用水一大碗煎藥末三兩和陳皮條子一處慢火煮候陳皮極軟控乾少時用餘剩乾藥末拌勻焙乾每服不拘多少細嚼溫薑湯下無時

家秘祛痛散七一　治諸般心氣痛或氣滯不行攻刺心腹痛連胸脇小腸吊疝及婦人血氣刺痛此方屢用無不神效

青皮　五靈脂去石　川楝子　穿山甲

大茴香各二錢　良薑香油炒　玄胡索　沒藥

檳榔各錢半　沉香一錢　木香錢二分　砂仁少許

右咀用木鼈子仁一錢二分同前藥炒令焦燥去木鼈不用共為細末每服一錢加鹽一星用酒或滚水送下

調痛散七二　治脾痛氣膈

木香　丁香　檀香　大香附

台烏藥　莪朮　肉桂　片薑黄

白生薑　白豆蔻　砂仁　炙甘草等分

右咀每服二錢半加紫蘇四葉煎湯服

丁香止痛散七三　方在熱陣百八

治心痛

良方烏藥散七四　治血氣壅滯心腹作痛

烏藥　莪朮醋浸炒　桂心　桃仁

當歸　青皮　木香等分

右為末每服二錢熱酒調下

奇效手拈散七五　治心脾氣痛

延胡索　五靈脂　草果　没藥（等分）

右為細末每服二三錢不拘時熱酒調下

良方遊山方　七六　治心脾痛此藥極奇葉石林遊山見一小寺頗整潔問僧所以仰給者則曰素無田産亦不苦求只貨數藥以贍其脾疼藥最為流布有詩云

草果玄胡索　靈脂并没藥

酒調一二錢　一似手拈却

右等分為末每服三錢不拘時温酒調下

舒筋湯 七七 一名如神湯 治閃肭血滯腰腹疼痛
及產後血滯作痛者更妙

當歸 玄胡索 桂心 等分

右為細末每服二錢不拘時溫酒調服○一方加杜
仲牛膝桃仁續斷亦可

丹溪玄桂丸 七八 治死血留胃脘當心作痛

玄胡索 一兩半 官桂 紅花 紅麯
滑石 各五錢 桃仁 三十粒

右為細末湯浸蒸餅為丸綠豆大每服四十丸薑湯

下

潔古枳术丸七九 治痞積消食強胃

枳實去瓤麩炒一兩 白术麩炒二兩

右為末荷葉裹燒飯為丸桐子大每服五十丸白术

湯下但久服之令人胃氣強實不復傷也○東垣橘

皮枳术丸即前方加陳皮一兩半夏一兩即名橘半

枳术丸

香砂枳术丸 八十 破滯氣消宿食開胃進食

木香 砂仁各五錢 枳實麩炒一兩 白术米泔浸炒二兩

右制服如术丸法

麯蘗枳术丸 八十一 治强食多食心胸滿悶不快

神麯炒 麥蘗炒 枳實麩炒各一兩 白术一兩

右制服如枳术丸法

東垣木香人參生薑枳术丸 八十二 開胃進飲食

木香三錢 人參五錢 乾生薑二錢半 陳皮四錢

枳實一兩炒 白朮一兩半

右為細末荷葉燒飯為丸桐子大每服三五十丸食前温水下

直指加味枳朮丸八三 治脾胃虛弱食積氣滯胸腹脹滿常服進食寛中和暢脾胃

白朮泔浸土炒二兩 枳實麸炒一兩 神麯炒 麥芽炒

陳皮 山查 香附炒各兩 砂仁炒半兩

如前法丸服

丹溪 枳實丸 八四 專治食積痞塊

枳實　白朮　山查　麥芽

神麯　半夏各一兩　蒼朮　陳皮各五錢

木香錢半　薑黃三錢

荷葉蒸飯為丸桐子大每服百丸食前薑湯下

醫統 大健脾丸 八五 又名百穀丸○徐東皐曰此方健

脾胃滋穀氣除濕熱寬胸膈去痞滿久服强中益氣

百病

人參　白茯苓飯上蒸　廣陳皮各二兩　枳實飯上蒸

青皮米醋洗　半夏麯炒　山查肉飯上蒸各二兩　白朮土炒二兩

穀芽炒一兩六錢　白豆蔻炒　廣木香各五錢

川黃連一兩六錢同吳茱萸五錢浸炒赤色去茱萸

右為末用長流水煑荷葉老米粥搗丸綠豆大每服百丸食前白湯下〇愚按此方雖佳但脾多畏寒若非有火當去黃連或仍加炮薑一二兩為妙

楊氏啓脾丸八六　治脾胃不和氣不升降中滿痞塞心

腹膨脹腸鳴泄瀉不思飲食

人参　白术　陳皮　青皮去瓤

神麯炒　麥芽炒　砂仁　厚朴

乾薑各一兩　甘草一兩半炙

煉蜜為丸彈子大每服一丸食前細嚼米飲下

和中丸八七　治久病厭厭不能食而臟腑或秘或溏

此皆胃虛所致常服之和中理氣消痰積去濕滯厚

腸胃進飲食

白术麩炒二兩四錢 厚朴薑製二兩 陳皮一兩六錢 半夏湯泡一兩

檳榔五錢 枳實五錢 炙甘草四錢 木香二錢

右用生薑自然汁浸蒸餅為丸桐子大每服三四十

丸食遠溫水送下

東垣和中丸 八八 開胃進食

人參 白术各三錢 乾薑炮 甘草炙

陳皮各一錢 木瓜一枚

右為末蒸餅丸桐子大食前白湯下三五十丸

養胃進食丸 八九 治脾胃虛弱心腹脹滿面色痿黄肌肉消瘦怠惰嗜卧或不思食常服滋養脾胃進飲食消痰涎辟風寒濕冷邪氣

人參 白茯苓 白朮泔浸炒 厚朴薑炒各二兩

神麯炒二兩半 大麥蘖炒 橘紅各一兩半 甘草炙一兩

蒼朮堅小而甘者米泔浸去皮五兩炒

右九味為末水麪糊丸桐子大每服三五十丸食前米湯或薑湯送下

消食丸九十　治一切食積停滯

山查　神麯炒　麥芽炒　蘿蔔子

青皮　陳皮　香附各二兩　阿魏一兩醋浸另研

湯泡蒸餅為丸桐子大每服五十丸食遠薑湯下

濟生導痰湯九一　治一切痰涎壅盛或胸膈留飲痞塞

不通

陳皮　半夏　茯苓　甘草

南星　枳殼炒

右等分每服六錢水二鍾薑五片或十片煎七分食後服

海藏五飲湯九二　一留飲在心下二僻飲在脇下三痰飲在胃中四溢飲在膈上五留飲在腸間凡此五飲以酒後飲冷過多所致

旋覆花　人參　橘紅炒　枳實

厚朴薑汁炒　半夏　茯苓　澤瀉

白术　猪苓各八分　前胡　桂心

芍藥　炙甘草各五分

水二鍾薑十片煎八分不拘時服飲酒傷者加葛根

砂仁

外臺茯苓飲九三　治胸有停痰宿水自吐出水後心胸間虛氣滿不能食消痰氣令能食

茯苓　人參　白术各三兩　枳實二兩

陳皮二兩半　生薑四兩

右六味水六升煮取一升八合分溫三服如人行八

九里進之

茯苓飲子 九四　治痰迷心竅怔忡不止

陳皮　半夏　茯苓　茯神

麥冬 各錢半　沉香　甘草 各五分

右水一鍾半薑五片煎七分服

千緡湯 九五　治痰喘不得卧人扶而坐一服即安

半夏 泡七個　炙甘草　皂角 炙各一寸　生薑 一指大

水一鍾半煎七分不拘時服

玉液湯九六 治七情所傷氣鬱生涎隨氣上逆頭目眩暈心嘈忪悸眉稜骨痛

半夏大者六錢湯泡七次切片

右作一服水鍾半薑十片煎七分入沉香末少許不拘時温服

四七湯九七局方 治七情之氣結成痰涎狀如破絮或如梅核在咽喉之間咯不出嚥不下此七情所為也或中脘痞滿氣不舒快痰飲嘔惡皆治之

半夏湯泡一錢半 茯苓一錢二分 蘇葉六分 厚朴薑製九分

水一鍾半生薑七片紅棗二枚煎八分不時服

得效 加味四七湯 九八 治心氣鬱滯豁痰散驚

半夏製二錢半 厚朴製 茯苓各一錢半 蘇葉

茯神各一錢 遠志 石菖蒲 甘草各五分

水二鍾加薑棗煎服

玉機 澤瀉湯 九九 治心下有支飲苦眩冒

澤瀉五錢 白朮二錢

水二鍾煎七分食遠溫服

朱砂消痰飲 百 治痰迷心竅驚悸怔忡

膽星五錢 朱砂二錢半另研 射香二分另研

右為末臨卧薑湯調下一錢

深師消飲丸 百一 治停飲胸滿嘔逆腹中水聲不思飲

食

白术二兩炒 茯苓五錢 枳實炒 乾薑炮各七錢

右為細末蜜丸桐子大溫水下三十九

秘方星香丸 百二 治諸般氣嗽生痰

南星 礬水泡一宿 半夏 製同上共泡之 香附 皂角水浸一周時各二兩 陳皮 去白四兩

右不見火為末薑汁糊丸每服五十丸臨卧薑湯送下

祛痰丸 百三 治風痰頭旋惡逆胸膈不利

南星 生 半夏 生 赤茯苓 橘紅 乾薑 炮等分

右為細末麪糊丸梧子大每服五七十丸不拘時米

飲送下

天花丸百四　亦名玉壺丸　治消渴引飲無度

人參　天花粉各等分

右為細末煉蜜丸桐子大每服三五十丸麥門冬湯下

局方玉壺丸百五　治風痰頭痛亦治諸痰

南星生　半夏生各一兩　天麻五錢　白麪三兩

右為末水和為丸桐子大每服三五十丸用水一大

盞煎沸入藥煮令藥浮即熟漉出放温別用生薑湯下〇一方 用南星半夏各二兩俱制天麻白礬各五錢共為末以薑汁糊丸如胡椒大每服三十丸白湯下

玉液丸 百六 治風熱痰涎壅盛利咽膈清頭目止欬嗽除煩熱

半夏 湯炮焙為細末 枯礬 研細各十兩 寒水石 煅赤為末水飛三十兩

右研勻麪糊丸桐子大每服三十丸食後淡薑湯下

潔古玉粉丸百七 治氣痰欬嗽

南星 半夏各一兩俱湯浸 橘紅二兩

右為末湯浸蒸餅為丸桐子大每服五七十丸人參生薑湯任下食後

瑞竹杏仁丸百八 治久嗽及老人欬嗽喘急不已睡卧不得服此立效

杏仁去皮尖炒 胡桃肉去皮

右等分研為膏加煉蜜丸如彈子大每服一丸食後

細嚼薑湯下

許學士神术丸百九　治痰飲此足陽明太陽治濕發散之劑也

茅山蒼术一斤米泔浸一宿去皮切片焙乾為末　生油麻五錢水二盞研細取漿

大棗十五個煮取肉研旋入麻漿拌和藥

右三味和丸桐子大晒乾每服五七十丸空心温酒下

三因麯术丸百十　治中脘宿食留飲酸蜇心痛嘈雜口

吐清水

神麯炒三兩 陳皮一兩 蒼术米泔浸三宿切炒一兩半

右為末生薑汁别煮神麯糊為丸薑湯送下

三仙丸百十一 一百 治一切濕痰痰飲胸膈煩滿痰涎不利頭目不清

南星 半夏 香附各等分

右南星半夏以滚湯泡過為末用生薑自然汁和不可太軟用楮葉或荷葉包住外以蒲包再包罨之令

發黃色晒乾收用須五六月內造如奮麯之法每制

丸藥用藥二兩香附一兩同為細末麪糊為丸綠豆

大每服四五十丸食後薑湯下

青州白丸子百十二　治男婦風痰壅盛手足癱瘓嘔

吐涎沫牙關緊急痰喘麻木及小兒驚風嘔吐

半夏七兩　南星三兩　白附子二兩　川烏半兩俱生用

右俱研羅為細末用生絹袋盛以磁盆盛井花水擺

洗粉出未出者以手揉擺再擂再擺以盡為度然後

日晒夜露每日一換新水攪而復澄春五夏三秋七冬十日去水晒乾白如玉片以糯米粉作稀糊丸如緑豆大每服二十九生薑湯下無時如癱瘓用酒下小兒驚風薄荷湯下五七丸

局方琥珀壽星丸百十三

天南星一斤　硃砂二兩研　琥珀一兩研

右先掘地坑深二尺用炭火五斤於坑内燒熱紅取出炭掃淨以好酒一升澆之將南星乘熱下坑内用

盆急蓋以泥壅護經一宿取出焙乾為末同二味和

勻用生薑汁打麪糊丸如桐子大每服五十丸煎人

參湯空心送下日三服○一方用琥珀四兩硃砂一

兩仍用猪心血三個和藥末內加糊為丸如前服

指迷茯苓丸 百十四 治人有臂痛手足不能舉或時左

右轉移此伏痰在内中脘停滞脾氣不能流行上與

氣摶脾屬四肢而氣不下故上行攻臂其脉沉細者

是也但治其痰則臂痛自止及婦人產後發喘四肢

浮腫者用此則愈此治痰第一方也

半夏製二兩 茯苓一兩 枳殻炒半兩 風化硝一錢半

右為末薑汁煮糊丸桐子大每服三五十丸薑湯下

累有人為痰所苦夜間兩臂常覺抽掣兩手戰棹至於茶鍾亦不能舉隨服隨效

又簡易方 治痰飲流注疼痛止用大半夏二兩風化硝一兩為末以薑汁煮糊丸桐子大薑湯下十五丸痰在上臨卧服在下食前服

丹溪白螺丸 百十五 治痰飲積胃脘痛

白螺螄殼 墻上年久者燒 滑石 炒 蒼朮

山梔 香附 南星 各一兩 枳殼

青皮 木香 半夏 砂仁 各五錢

右為末生薑汁浸蒸餅為丸綠豆大每服三四十丸

薑湯下○春加川芎夏加黃連冬加吳茱萸各五錢

丹溪潤下丸 百十六 降熱痰甚妙

半夏 二兩依橘紅製 南星 依橘紅製 炙甘草 黃芩

黄連各一兩 橘紅半斤以水化鹽五錢拌匀煮乾焙

右為末蒸餅丸緑豆大每服五七十丸白湯下

集成潤下丸百十七 治胸膈停痰降痰甚妙

橘紅一斤鹽五錢同水浸煮乾 甘草炙一兩

右為末湯浸蒸餅為丸緑豆大每服五十丸白湯下

丹溪黄瓜蔞丸百十八 治食積作痰壅滯喘急

瓜蔞仁 半夏 山查 神麯炒等分

右為末瓜蔞汁丸薑湯下五十丸

丹溪杏仁蘿蔔子丸 百十九 治氣壅痰盛欬嗽

杏仁 蘿蔔子 炒各一兩

右為末粥糊丸桐子大每服五十丸白湯下

金匱陳皮湯 百二十 治嘔吐呃逆

陳皮 四兩 生薑 半斤

水七升煮取三升温服一升下咽即愈

竹茹湯 一二一 治胃熱嘔吐

半夏 薑汁製 乾葛 各三錢 甘草 二錢

右為末每服二錢水一鍾薑三片竹茹一彈許棗一枚同煎七分去柤温服

橘皮竹茹湯 一二二 治吐利後胃虚膈熱呃逆者

人參 竹茹 橘紅各二錢 甘草炙一錢

水一鍾半生薑五片棗一枚煎八分温服

二汁飲 一二三 治反胃

甘蔗汁二分 薑汁一分

二味和匀每温服一碗日三服則吐止

東垣葛花解醒湯 一二四 治飲酒太過痰逆嘔吐心神煩亂胸膈痞塞手足顫揺飲食減少小便不利

人參　白术　茯苓　砂仁

白豆蔻　葛花各一錢　青皮　陳皮

猪苓　澤瀉各七分　神麯　木香各五分

水二鍾生薑五片煎七分食遠稍熱服取微汗酒病去矣或為末薑醋湯調服二三錢亦可

金匱猪苓散 一二五 治嘔吐病在膈上思水者

猪苓　茯苓　白术等分

右三味杵為散飲服方寸匕日三服

大全人參散一二六　治脾胃虚寒霍亂吐瀉心煩腹痛飲食不入

人參　當歸　厚朴　橘紅各二錢

乾薑炮　炙甘草各五分

加棗一枚水煎服

濟寮六和湯一二七　治夏秋暑濕傷脾或飲冷乘風多

食瓜果以致容寒犯胃食留不化遂成痞膈霍亂嘔吐及廣南夏月瘴疾寒熱等證

半夏　人參　炙甘草　砂仁

杏仁各一錢　赤茯苓　扁豆炒　藿香

木瓜各二錢

右㕮咀每服五錢水二鍾生薑三片棗一枚煎溫服

一方有白朮香薷厚朴各一錢名六和半夏湯

良方丁香散一二八　治霍亂嘔吐不止

丁香五分 藿香 枇杷葉拭去毛各一錢

右㕮咀水一鍾半薑一片煎六分熱服

局方 丁香半夏丸一二九 治胃寒嘔吐吞酸

丁香一兩 紅豆炒 半夏製 白朮炒各二兩

陳皮三兩

右為末薑汁打糊丸胡椒大每服二三十丸薑湯下

局方 半夏丁香丸百三十 治脾胃宿冷胸膈停痰嘔吐

惡心吞酸噫腐心腹否滿不思飲食

肉豆蔻　丁香　木香　藿香

人參　陳皮去白各二錢　半夏製三兩

右為細末薑汁煮糊丸桐子大每服三十丸薑湯下

和劑大七香丸　一三一　治脾胃虛冷心膈噎塞漸成隔氣及脾泄瀉痢反胃嘔吐

香附二兩　麥芽炒一兩　砂仁　藿香

官桂　甘草　陳皮各二兩半　丁香皮三兩半

甘松　烏藥各六錢半

右為末蜜丸彈子大每服一丸嚼碎鹽酒鹽湯任下

忌生冷肥膩

良方許則仁半夏丸一三二 治胃冷嘔逆不食

半夏洗去滑一斤 小麥麵一斤

右水和丸彈子大水煮熟初服四五丸二服加至十

四五丸旋煮間服之

萬氏定喘湯一三三 治諸喘久不愈○按此方必風痰

在肺者乃可用他則忌之

白果三七枚去殼切碎炒　欵冬花　桑白皮蜜炒　麻黄

製半夏各三錢　蘇子二錢　黄芩微炒　杏仁各錢半

水三鍾煎二鍾作二次服不拘時徐徐飲

歌曰　諸病原來有藥方　惟愁齁喘最難當

麻黄桑杏尋蘇子　白果冬花用更良

甘草黄芩同半夏　水煎百沸不須薑

病人遇此仙丹藥　服後方知定喘湯

局方人參定喘湯一三四　治肺氣上喘喉中有聲坐卧

不安胸膈緊痛又治肺感寒邪欬嗽聲重

人參　麻黃　阿膠　半夏麯

五味子　粟殼　甘草各八分　桑白皮錢半

水二鍾薑三片煎八分食後服

良方百合湯一三五　治肺氣壅滯欬嗽喘悶多渴腰膝

浮腫小便淋澀

百合　赤茯苓　陳皮　桑白皮

紫蘇　大腹皮　枳殼　馬兜鈴

人參　猪苓　炙甘草　麥冬各一錢

右分二服每服水一鍾半薑一片棗一枚煎七分不拘時溫服

局方 五虎湯 一三六 治風寒所感熱痰喘急

麻黄七分　細茶八分　杏仁去皮尖一錢　石膏一錢半

甘草四分

水一鍾半薑三片棗一枚煎服

三因 神秘湯 一三七 治上氣喘急不得卧

人參一錢　陳皮　桔梗　紫蘇各錢半

五味子十五粒

水一鍾半煎七分食遠溫服

直指神秘湯一三八　治水氣作喘

人參　陳皮　桔梗　紫蘇

半夏　桑白皮　檳榔各一錢　炙甘草五分

五味子十五粒

水二鍾薑三片煎八分食遠溫服

蘿蔔子湯一三九　治積年上氣喘促唾膿血不止而氣實者宜之

蘿蔔子一合研碎水煎食後服其效如神

三因葶藶大棗瀉肺湯百四十　治上氣喘急身與面目俱浮鼻塞聲重不聞香臭胸膈脹滿將成肺癰

甜葶藶炒研細三錢　大棗十枚去核

水二鍾先煎大棗至一鍾去棗入葶藶煎至八分食後服○須先服小青龍湯二服方用此

蘇子煎一四一　治上氣欬嗽

蘇子　杏仁　生薑汁　生地黃汁　白蜜各一斤

右將蘇子搗爛以二汁和之絹紋取汁又搗又和如此六七次則味盡乃去粗以蜜和之置銅器中於湯上煎之如飴每服二匙日三次夜一二次病愈即止

醫林杏仁煎一四二　治喘嗽

杏仁去皮尖炒　胡桃肉去皮

右等分研膏煉蜜丸彈子大每服一丸臨卧細嚼薑湯送下○一方以胡桃肉三枚薑三片臨卧嚼服飲湯三四口再嚼再飲就卧止嗽無痰

良方杏仁膏一四三 治欬嗽喘急喉中枯燥如物塞兼唾血不止

杏仁二兩去皮尖炒研如膏 真酥三兩 阿膠二兩砂炒為末

生薑汁一合 白蜜五合 蘇子二兩微炒研膏

右和匀銀鍋內慢火熬成膏每服一匙不拘時米飲

飲調下

良方 前胡散 一四四 治心胸煩熱不利欬嗽涕唾稠粘

前胡　桑白皮　麥門冬　貝母 各錢半

甘草 炙五分 杏仁 去皮尖一錢

水一鍾半薑三片煎七分溫服

濟生 百花膏 一四五 治欬嗽不已或痰中有血

百合 蒸焙乾 款冬花 等分

右為細末煉蜜丸龍眼大臨卧細嚼一丸薑湯下

本事枳殼散 一四六 治心下痞悶作痛噯氣如敗卵

枳殼 白朮各五錢 香附一兩 梹榔二錢

右為細末每服二錢米飲調下日二三服不拘時

保和湯 一四七 治中染瘴氣發熱嘔吐腹滿不食

厚朴薑製 半夏製 大腹皮黑豆水洗 橘紅各八分

柴胡 枳殼 甘草各五分 生薑煨三錢

水煎溫服

十味保和湯 一四八 治胃虛氣滯作噯

人參　白朮　茯苓　半夏製

陳皮各一錢　藿香　香附　砂仁各六分

炙甘草　木香各三錢

水一鍾半薑三片棗二枚煎七分食前溫服

丹溪六鬱湯一四九　能解諸鬱

香附二錢　橘紅　蒼朮　撫芎

半夏炮各錢　赤茯苓　梔子炒各七分　炙甘草

砂仁各五分

水二鍾薑三片煎八分溫服○氣鬱加烏藥木香檳
榔紫蘇乾薑倍砂仁香附○濕鬱加白朮○熱鬱加
黃芩倍梔子○痰鬱加南星枳殼小皂莢○血鬱加
桃仁紅花丹皮○食鬱加山查神麯麥芽

局方三和散 百五十 治七情氣結脾胃不和心腹痞滿

大便秘澁

羌活　紫蘇葉　木瓜　大腹皮

沉香各一錢　木香　檳榔　陳皮

白术　川芎　炙甘草各七分半

右咀分二服每服水一鍾煎六分不拘時服

丹溪生韭飲一五一　治食鬱久則胃脘有瘀血作痛大能開提氣血

生韭　搗取自然汁一盞加温酒一二杯同服

右先以桃仁連皮細嚼數十枚後以韭汁送下

三因温膽湯一五二　治氣鬱生涎夢寐不寧怔忡驚悸心虚膽怯變生諸證

半夏湯泡　枳實　竹茹各一兩　陳皮一兩五錢

茯苓七錢　炙甘草四錢

每服四五錢生薑七片棗一枚水一鍾半煎七分食遠温服

○一方有遠志一兩

十味温膽湯一五三　治證同前兼治四肢浮腫飲食無味心虛煩悶坐臥不安夢遺精滑等證

半夏湯泡　枳實麩炒　陳皮各二錢　白茯苓錢半

人參　熟地　棗仁炒　遠志製

五味各一錢　炙甘草五分

水二鍾生薑五片棗一枚煎八分不拘時服

越鞠丸一五四　治六鬱胸膈痞滿或吞酸嘔吐飲食

不和瘡疥等證

香附　山查　神麯炒　麥芽炒

撫芎　蒼朮　梔子炒各等分

右為末水調神麯糊丸桐子大每服五七十丸滾湯

下○丹溪越鞠丸無山查麥芽

流氣丸一五五　治五積六聚癥瘕痞塊留飲之疾是皆鬱氣客於腸胃之間皮膚之下久而停留變而為痞此藥能通滯氣和陰陽消舊飲雖年高氣弱亦可緩緩服之

木香　小茴香　橘紅　菖蒲

青皮　廣茂炮　檳榔　蘿蔔子

神麯炒　麥芽炒　枳殼麩炒　補骨脂炒

砂仁　蓽澄茄各一兩

右為末麫糊丸桐子大每服五十丸細嚼白豆蔻仁一枚食後白湯送下

嚴氏五膈散一五六　治五膈五噎

人參　白术　甘草　白豆蔻

半夏　桔梗　乾薑　蓽澄茄

木香　杵頭糠　沉香各三分　枇杷葉五片炙去毛

水二鍾薑七片煎七分温服

局方五膈寬中散 一五七 治七情四氣傷於脾胃以致陰陽不和遂成膈噎一切氣逆並治

青皮 陳皮各五錢 香附童便浸炒 厚朴薑汁炒

甘草各六錢 白豆蔻 砂仁 丁香

木香各一錢

右為細末每服二錢薑鹽湯點服

選要十膈散 一五八 治十般膈氣○風冷氣熱痰食水

憂思喜

人參　白术　茯苓　炙甘草

陳皮　枳殼麩炒　神麯炒　麥芽

乾薑炮　官桂　訶子煨　三稜炮

莪术炮各一兩　厚朴薑炒　檳榔　木香磨各半兩

右為細末每服二錢入鹽少許白湯調服如脾胃不和腹滿脹悶用水一鍾薑五片棗一枚鹽少許煎七分服

局方五噎散一五九　治胸膈痞悶諸氣結聚脇肋脹滿

痰逆惡心不進飲食

白术　南星製　半夏麯　枳殼麩炒

青皮　草果　麥芽　大腹皮

乾薑　丁香各一錢　甘草五分

水一鍾半薑五片煎七分不拘時服

嘉木散百六十　一名穀神散○治脾胃不和胸膈痞

悶氣逆生痰不進飲食五膈五噎

白茯苓　砂仁　薏仁炒仁　枇杷葉去毛薑炙

桑白皮炒　沉香磨汁　五味子　白豆蔻

炙甘草　丁香　人參　白术各五分

木香磨汁　青皮　陳皮　杜仲薑汁炒

穀芽炒　藿香　大腹皮洗　石斛酒炒

半夏麯炒　神麯炒　隨風子　檳榔各三分

右水二鍾薑三片棗二枚煎八分食遠服○五噎入

柿乾一個膈氣吐逆入薤白三寸棗五枚同煎

局方人參豆蔻湯一六一　治嗝噎寛中順氣

人參　炙甘草　白豆蔻　石菖蒲各五分

白朮　陳皮　半夏麯　蘿蔔子炒研

當歸　厚朴各八分　藿香　丁香各三分

水一鍾半薑三片粟米一撮煎七分服

良方紫蘇子飲 一六二 治嗝噎上氣欬逆因怒未定便夾氣飲食或食飲畢便怒以致食與氣相逆遂成嗝噎之候

真蘇子　訶子煨　蘿蔔子微炒　杏仁去皮尖麸炒

人參各一錢 木香五分 青皮 炙甘草各二錢

右㕮咀水一鍾半薑三片煎七分服

枇杷葉煎一六三 治五噎立效

枇杷葉拭去毛尖 橘紅各三錢 生薑半兩

水一鍾半煎七分作二次温服

統旨補氣運脾湯一六四 治中氣不運噎塞

人參二錢 白朮三錢 黄芪一錢炙 橘紅

茯苓各錢半 砂仁八分 甘草炙五分

水一鍾半薑一片棗一枚煎八分食遠服

利膈散 一六五 治胸痺膈塞不通

人參 白术 陳皮 赤茯苓

前胡各一錢 乾薑 桂心 訶子

甘草各五分

水一鍾半薑五片煎七分頻頻服之効

發明人參利膈丸 一六六 治胸中不利痰逆喘滿利脾胃

壅滯治噎嗝聖藥○按此方必噎嗝而大便秘結者

乃可用

人參　當歸　藿香各一兩　木香

檳榔各七錢　枳實炒　甘草各八錢　厚朴薑炒

大黄酒浸各二兩

右為末滴水丸桐子大溫水送下三十丸

草豆蔻丸一六七　治酒積胃口痛咽膈不通

草豆蔻煨　白朮各一兩　麥芽煨　神麯炒

黄芩　半夏炮各五錢　枳實炒二兩　橘紅

青皮各三錢 乾薑二錢 炒鹽五分

湯浸蒸餅為丸綠豆大每服百丸煎白湯下○按此方當去黃芩庶乎不滯

東垣清暑益氣湯一六八 治暑熱蒸人四肢倦怠胸滿氣促肢節疼痛身熱而煩小便黃數大便溏瀉自汗口渴不思飲食

人參 黃芪 升麻 蒼术各一錢

白术炒 神麯炒各五分 陳皮 炙甘草

黄栢　麥冬　當歸各五分　乾葛

五味　澤瀉　青皮各三分

水煎温服

局方香薷飲一六九　治一切暑熱腹痛或霍亂吐利煩

心等證○按此方惟治陽暑隂暑不宜用

香薷一斤　厚朴製　白扁豆炒各半斤

每服五錢水一鍾半煎八分不拘時温服

五物香薷飲百七十　治一切暑毒腹痛霍亂吐瀉或

頭痛昏憒等證

香薷　茯苓　白扁豆　厚朴

炙甘草各一錢

右為咀水一鍾半煎服○本方加黃連即名黃連香薷飲

百一
十味香薷飲一七一　治伏暑身體倦怠神昏頭重吐瀉等證

香薷二錢　人參　黃芪　白朮

茯苓 厚朴薑炒 陳皮 白扁豆炒各一錢

木瓜 炙甘草各五分

水二鍾煎七分食遠溫服

黃連香薷飲 一七二 治陽暑中熱

黃連四兩 香薷一斤 厚朴半斤

每服四錢如前煎服

局方縮脾飲 一七三 解伏暑除煩渴消暑毒止吐瀉霍

亂

白扁豆炒　乾葛各二兩一作乾薑　炙甘草　烏梅肉

砂仁　草果各四兩

右㕮咀每服四錢水煎冷服

七味滲濕湯局方　一七四　治寒濕所傷身體重著如坐水中小便赤澁大便溏泄因坐卧濕地或為陰雨之所襲也

炙甘草　蒼术　白术各一錢　茯苓

乾薑各二錢　丁香　橘紅各二分半

水一鍾半薑三片棗一枚煎七分食前服

清熱滲濕湯一七五　方在寒陣百十一

治濕熱浮腫小水不利

金匱防已黃芪湯一七六　治風濕脉浮身重汗出惡風者

防已　黃芪去蘆各一兩　甘草炙半兩　白朮七錢半

右㕮咀每用五錢生薑四片棗一枚水盞半煎八分溫服良久再服○喘者加麻黃半兩○胃中不和加芍藥○氣上衝者加桂枝○下有陳寒者加細辛○

服後當如虫行皮中從腰下如氷厚坐被上又以一被繞腰下溫令微差

一百除濕湯一七七　治中濕身體重着腰腿痠疼大便溏小便或澁或利

半夏麯　蒼朮　厚朴　茯苓各錢半

陳皮七分　藿香　炙甘草各五分

水二鍾薑七片棗二枚煎七分食遠服

羌活勝濕湯一七八　治外傷濕氣一身盡痛者此方

通治濕證

羌活　獨活各二錢　藁本　防風各錢半

蔓荊子　川芎　炙甘草各五分

水二鍾煎八分食後温服○如身重腰痛沉沉然經有寒也加酒防已五分附子五分

東垣升陽除濕湯一七九　治脾胃虛弱不思飲食腸鳴腹痛泄瀉無度小便黄四肢困弱

升麻　柴胡　羌活　防風

半夏　益智仁　神麯　澤瀉各五分

麥蘗麵　陳皮　猪苓　甘草各三分

蒼朮一錢

右㕮咀作一服水三大盞生薑三片棗二枚煎至一盞去租空心服

拔萃升陽除濕防風湯百八十　治下痢下血大便秘滯裏急後重數至圊而不能便或下白膿慎勿利之舉其陽則陰自降矣

防風二錢 白朮 白茯苓 白芍藥各一錢

蒼朮酒浸去皮炒四錢

右先將蒼朮用水一鍾半煎至一鍾入諸藥同煎至八分食前服

三因白朮酒 一八一 治中濕骨節疼痛

白朮一兩

用酒三盞煎一盞不拘時頻服不能飲酒者以水代之

仲景五苓散一八二　治暑熱煩燥霍亂泄瀉小便不利而渴淋澁作痛下部濕熱

白术　猪苓　茯苓各七錢半　肉桂五錢

澤瀉一兩二錢半

古法為細末每服二錢白湯調下日三服○今法以水煎服

加減五苓散一八三　治濕熱黃疸小水不利

即前五苓散去肉桂加茵陳各等分

加味五苓散 一八四 治濕勝身痛小便不利體痛發渴此太陽經解表滲利之劑治風濕寒濕藥也

即前五苓散加羌活

金匱茵陳五苓散 一八五 治黄疸

茵陳蒿末十分 五苓散五分

右和勻先食飲方寸匕日三服

柴胡茵陳五苓散 一八六 治傷寒温濕熱病發黄小便赤黑煩渴發熱此以汗下太早濕熱未除以致遍

身發黃嘗用此治之甚效

五苓散一兩　加茵陳半兩　車前子一錢　木通　柴胡各一錢半

右分二服用水一鍾半燈草五十莖煎服連進數服小便清利而愈○因酒後者加乾葛二錢

四苓散一八七

即前五苓散去肉桂

仲景豬苓湯一八八　治傷寒下後脉浮發熱渴欲飲水

小便不利及少陰病下利欬而嘔渴心煩不得眠者

猪苓去皮 茯苓 阿膠 滑石

澤瀉各一兩

右五味以水四升先煮四味取二升去滓内阿膠烊盡服七合日三服

茯苓湯一八九 治濕熱泄瀉或飲食泄瀉

茯苓 白朮炒各五錢

右用水煎食前服○一方有芍藥等分名白朮散

胃苓湯百九十　治脾濕太過泄瀉不止

陳皮　厚朴　甘草　蒼朮

白朮　茯苓　澤瀉　猪苓

肉桂各等分

每服五六錢薑五片棗二枚水煎服

橘半胃苓湯一九一　治嘔吐泄瀉脹滿不下食不知味

橘紅　半夏製各一錢　蒼朮米甘浸炒　白朮炒

厚朴　炙甘草　人參　茯苓

澤瀉　茅根各二錢　薑汁數匙

水二鍾煎一鍾入薑汁再煎一二沸陸續飲之

柴苓湯一九二　治身熱煩渴泄瀉

白术　茯苓　澤瀉　柴胡

猪苓　黄芩

右水煎服

加減柴苓湯一九三　治諸疝此和肝腎順氣消疝治

濕之劑

柴胡　半夏　茯苓

白朮　甘草　猪苓

澤瀉　山梔炒

山查　荔核煨各等分

右㕮咀水二鍾薑三片煎八分食前服

局方真人養臟湯一九四　治大人小兒冷熱不調下痢赤白或如膿血魚腦裏急後重臍腹疼痛或脫肛墜下酒毒便血並治之

人參　當歸　訶子　肉豆蔻麪煨

炙甘草　木香各一錢　芍藥　白术各三錢

肉桂五分　粟殼蜜炙二錢

水二鍾煎八分食遠服○臟寒者加附子一錢

良方草果散一九五　治中寒泄瀉腹痛無度

厚朴薑汁炒二兩　肉豆蔻麪煨　草菓煨各十個

右每服三錢薑水煎服

經驗大橘皮湯一九六　治濕熱内甚心腹脹滿水瀉小

便不利

橘皮　檳榔各一錢　滑石　茯苓

猪苓　澤瀉　白朮各二錢　官桂

甘草各五分

水一鍾半生薑三片煎八分食遠服

消食導氣飲一九七　治凡遇氣怒便作泄瀉此必因

怒挾食所致其有脾土本虛不勝肝氣者此方主之

人參　白朮　茯苓　炙甘草

川芎　半夏　青皮　陳皮

枳實　香附　神麯　砂仁

木香　上酌虚實增減用

水一鍾半薑三片煎七分食遠温服

外臺黄芩湯一九八　治乾嘔下利

黄芩　人參　乾薑各三兩　桂枝一兩

半夏半升　大棗十二枚

右六味以水七升煮取三升温分三服

秘傳斗門方 一九九 治毒痢臟腑撮痛膿血赤白或下血片日夜不息及噤口惡痢裏急後重全不進食久渴不止他藥不能治者立見神效

乾薑炒四錢 粟殼蜜炙八錢 地榆 甘草炙各六錢 白芍藥炒三錢 黑豆炒去皮一兩半

右㕮咀可分三四貼用水一鍾半煎七分食遠熱服

治痢簡易八方 二百

外臺秘要方 治痢下白膿不止用白麪一味炒熟

搗篩煮米粥内方寸匕食之此療瀉痢日至百行藥所不及者也

千金方　治痢用薤白一握細切煮粥食之

聖惠方　治赤白痢疾以葱一握切和米煮粥空腹食之

千金翼方　用雞子以醋煮極熟空腹食之治久痢赤白

又方　用乾薑於火内燒焦黑不可成炭放磁瓶中

閉冷為末每服一錢米飲調下

炙雞散　治脾胃氣虛腸滑下痢用黃雌雞一隻製如食法以炭火炙之槌扁用鹽醋刷遍又炙令極熟而燥空腹食之

一方　治熱毒下血痢久不已用當歸黃連各三錢烏梅五個水煎八分空心服

類方麯朮丸二百一　治暑濕暴瀉壯脾溫胃及治飲食所傷胸膈痞悶

神麯炒　蒼朮米泔浸一宿切炒等分

右為細末麪糊丸桐子大每服七八十丸米飲下不拘時

局方戊已丸二百二　治脾經受濕瀉痢不止米穀不化臍腹刺痛

黄連炒　吳茱萸泡炒　白芍藥各五兩

一方黄連四兩吳茱萸二兩芍藥三兩

右為細末麪糊丸桐子大每服七十丸空心食前米

飲下

聖惠雙荷散 二百三 治卒暴吐血

藕節七節 荷葉頂七個

右入蜜一匙擂細水二鍾煎八分温服或為末蜜湯調下二錢亦妙

直指側柏散 二百四 治内損失血飲酒太過勞傷於内氣血妄行血如湧泉口鼻皆出須臾不救服此即安又治男婦九竅出血

人參　荊芥穗炒灰各一錢　側柏葉蒸乾一兩半

右為末每服三錢入飛羅麪三錢拌匀汲水調粘啜服

地黃煎二百五　治吐血憂恚內傷胸膈疼痛及虛勞唾血百病久服佳

用生地黃一斤擣取汁於銀鍋或砂鍋微火煎一二沸入白蜜一斤再煎至三升每服半升日三服

一方用生地黃汁一升生薑汁一合和匀温服日三

四次

一方治虛勞吐血用生地黄五斤擣以好酒五升煮去查服

枇杷葉散二百六局方 治暑毒攻心嘔吐鮮血

香薷二錢　厚朴　甘草　麥門冬

木瓜　茅根各一錢　陳皮　枇杷葉

丁香各五分

右為末每服二錢薑水煎服

阿膠散 二百七 治肺燥欬嗽不已及唾血

阿膠炒 白芨各二錢 天門冬 北五味子

人參 生地黄 茯苓各一錢

右以白芨為細末餘藥用水一鍾半入蜜二匙秫米百粒生薑五片同煎熟入白芨末調食後温服

阿膠散 二百八 良方 方在婦人六

安胎補血氣

阿膠散 二百九 錢氏 方在小兒三四

治小兒欬嗽喘急

綠雲散二百十 治吐血

栢葉　人參　阿膠炒珠　百合

右等分為末每服二錢不拘時糯米飲調下

簡易黑神散二一一 治一切吐血及傷酒食醉飽低頭掬損吐血致多并血熱妄行口鼻俱出但聲未失無有不效

百草霜不拘多少村居者佳

右研細每服二錢糯米煎湯下喜凉水者以新汲水調服○衂血者用少許吹鼻○皮破出血或炙瘡出血摻之即止

局方黑神散 二一二 方在婦人五十

治產後惡露不盡胎衣不下攻心腹痛

天門冬丸 二一三 治吐血咯血大能潤肺止嗽

天門冬 一兩　貝母　杏仁 炒 各七錢　白茯苓　阿膠　甘草 各五錢

右為細末煉蜜丸芡實大每噙化一丸津嚥下

髮灰散 二一四

治起居所傷小便尿血或忍尿脬轉臍下急痛小便不通又治肺疽心衄内崩吐血舌上出血

亂髮燒灰即血餘也

右每服二錢以米醋湯調服

棕灰散 二一五

治大腸下血不止或婦人崩漏下血

敗棕 不拘多少燒灰存性為細末

每服二錢空心好酒或清米飲調服

寶鑑平胃地榆湯二一六　治邪陷陰分則陰結便血

陳皮　厚朴　蒼朮　甘草

地榆　人參　白朮　當歸

芍藥　升麻　乾葛　茯苓

神麯　乾薑炒　香附各等分

右㕮咀每服五錢加薑棗煎空心服

海藏愈風湯二一七　一名舉卿古拜散○治一切失血

筋脉檕急產後或汗後搐搦

荆芥穗 為細末

右先炒大豆黄卷以酒沃之去黄卷取淨汁調前末三四錢服之輕者一服重者二三服即止氣虛者忌服童便調亦可

局方小烏沉湯 二一八 治氣逆便血不止

烏藥 一兩 炙甘草 香附 醋炒四兩

右為末每服二錢食前鹽湯下

除濕和血湯 二一九 治陽明經濕熱虛陷便血腹痛

當歸身酒拌 牡丹皮 生地黃 熟地黃

黄芪炙 炙甘草各一錢 白芍藥錢半 生甘草

升麻 陳皮 秦艽 蒼术

肉桂各五分

水二鍾煎八分空心候宿食消盡熱服

驅瘧飲 二百二十 治諸瘧久瘧不愈者

草果 青皮 陳皮 人參

茯苓　半夏製　厚朴　蒼术炒
檳榔　白术　甘草各一錢　良薑五分
水二鍾棗二枚烏梅一個煎八分食遠服
祛瘧飲二二一　三發後火盛氣强者可因其衰而減
之立效
貝母去心　紫蘇各一錢　橘紅　山查肉
枳實各錢半　檳榔八分　柴胡七分　甘草炙三分
知母去毛淨鹽酒炒過五錢

右用水二鍾煎一鍾又將查再煎至八分并一處露過宿臨發日早温服一半未發前一時許再温服後半

捷瘧飲　二二二　史崇質傳云得之四明胡君屢試屢驗

黄芪炙一錢六分　人參　白术　白茯苓

橘紅　砂仁　草果　五味子各一錢

甘草七分　烏梅三枚

水二鍾薑三片棗二枚煎一鍾温服

濟生 萬安散 二二三 治一切瘧病之初邪盛氣壯者進此藥以逐邪取效若氣虛胃弱及妊婦皆不宜用

蒼术 厚朴 薑炒 陳皮 檳榔

常山 酒浸 甘草 炙各一錢半

右㕮水一鍾半煎八分露一宿臨發早温服忌熱物

濟生 鼈甲飲子 二二四 治瘧疾久不愈脇下痞滿腹中結塊名曰瘧母

鼈甲 醋炙 川芎 黄芪 草果仁

檳榔　白朮　橘紅　白芍藥

甘草　厚朴製等分

右㕮咀每服五七錢水一鍾薑七片棗一枚烏梅少許煎七分溫服無時

濟生清脾飲 二二五 治瘴瘧脉來弦數但熱不寒或熱多寒少口苦咽乾小便赤濇

厚朴製　青皮　白朮　草果仁

柴胡　茯苓　黃芩　半夏

甘草各等分

每服四五錢水一鍾半薑三片棗一枚未發前服忌

生冷油膩○寒多者可加肉桂熱多者可加黄連

局方草果飲二二六　治諸瘧通用

草果　川芎　白芷　蘇葉

青皮　陳皮　良薑　炙甘草

右等分㕮咀每服五錢水一鍾半煎七分温服留渣

兩服并煎當發日進三服不以時加薑煎亦治寒瘧

簡易七寶飲二二七 治一切瘧疾不拘寒熱鬼瘧食瘧

常山 草果 檳榔 厚朴製

青皮 陳皮 甘草各一錢

右用酒水各一鍾共煎一鍾將查亦如前再煎一鍾各另放俱露一宿至次日當發侵晨面東先溫服頭服少頃再飲二服大有神效

簡易四獸飲二二八 治諸瘧和胃消痰

人參 白朮 茯苓 甘草炙減半

陳皮　半夏　草果　烏梅各等分

大棗三枚　生薑五片

右㕮以鹽少許醃食頃濕紙厚裹慢火煨香熟每服

四五錢水一鍾半煎七分温服

局方常山飲二二九　治瘧疾發散不愈漸成痨瘵

知母　常山　草果　烏梅肉各一斤

良薑二十兩　炙甘草一斤

右㕮每服五錢薑五片棗一枚水煎服

丹溪截瘧丹二百三十

雄黄一兩　人參五錢

右為末於端午日用粽子尖丸桐子大每服一丸發日早面東井花水吞之忌諸熱味

集成截瘧常山飲二三一

常山　草果　穿山甲炙　甘草炙

檳榔　知母　烏梅

右等分用水酒各一鍾煎至一鍾露一宿發前二時

溫服如吐則順之

寶鑑交加飲子 二三三 治瘧食瘴氣虛寒等瘧

肉豆蔻 草豆蔻各二個一生一煨 厚朴二錢半生半炒 大甘草二寸半半生半炙

生薑一兩半生半煨

右水一鍾半煎八分發日空心服未愈再服

柴半湯 二三三 治脉濡濕瘧一身盡痛手足沉重寒

多熱少

柴胡 人參 半夏 黃芩

甘草　陳皮　厚朴　蒼朮

水二鍾加薑棗煎服

局方人參養胃湯二三四　治外感風寒内傷飲食寒熱頭疼身體拘急山嵐瘴氣瘧癘瘧疾等症

半夏　厚朴薑製　橘紅各八分　藿香

草果　茯苓　人參各五分　蒼朮一錢

炙甘草三分

薑七片烏梅一個水煎服

和解散 二三五 治瘴病初作胸腹滿悶頭眩發熱

厚朴薑製炒 陳皮各二兩 甘草四兩炒 藁本

桔梗各三兩 蒼术半斤米泔浸一宿二兩

右為粗末每服五七錢水鍾半薑三片棗二枚煎七分熱服日三服夜一服○此藥不拘傷風傷寒初作未分證候任服之大能助胃祛邪和解百病

檳榔煎 二三六 治山嵐瘴氣寒熱嘔吐腹滿不思飲食

檳榔　蒼朮　厚朴　陳皮

草果各一錢　甘草一寸　煨生薑一塊

水一鍾半棗三枚煎八分食遠熱服

屠酥酒二三七　辟山嵐瘴氣瘟疫等氣

麻黄　川椒去合口者　細辛　防風

蒼朮製　乾薑　肉桂去粗皮　桔梗等分

右為粗末絹袋貯浸酒中密封瓶口三日後可服每日

空心服一二杯冒露遠行辟諸邪氣但不宜多飲使醉

降椒酒 二三八 辟一切瘴氣尋常宜飲之

降真香二兩細剉 川椒一兩去合口者

右用絹囊貯浸無灰酒中約二斗許每日飲數杯百邪皆不能犯兼治風濕脚氣疝氣冷氣及背面惡寒

風疾有效

省風湯 二三九 局方 治治中風挾熱挾痰口噤口眼歪斜

攣急疼痛風盛痰實

防風 南星生用各二錢 半夏浸洗生用

黄芩　甘草各一錢

水二鍾生薑五片煎八分不拘時服○此藥同導痰湯合服尤妙

局方八風散二百四十　治風氣上攻頭目昏眩肢體拘急煩疼或皮膚風瘡痒痛及寒壅不調鼻塞聲重

藿香去土半斤　前胡去蘆　白芷各一斤

黄芪炙　甘草炙　人參各二斤

羌活　防風各三斤

右爲細末每服二錢水一鍾入薄荷少許煎七分食後温服或用臘茶清調服一錢亦可○小兒虚風用臘茶清調下半錢更量兒大小加減服

防風當歸湯二四一　治發汗過多發熱頭搖口噤脊背反張太陽兼陽明證也宜去風養血

防風　當歸　川芎

熟地黄等分

每服一兩水二鍾煎一鍾温服

順風勻氣散二四二　治中風中氣半身不遂口眼喎斜先宜服此

白朮　人參　天麻各五分

沉香　白芷　青皮

甘草各四分　紫蘇　木瓜各三分

烏藥一錢半

水一鍾半薑三片煎七分食遠服

易簡星香湯二四三　治中風痰盛服熱藥不得者凡痰

厥氣厥身熱面赤者宜服之

南星八錢　木香一錢

右作二貼水二鍾生薑十片煎七分不拘時服

濟生八味順氣散二四四　治氣厥身冷似中風凡患中風者先服此藥順氣次進治風藥

人參　白朮　茯苓

青皮　陳皮　白芷

台烏各一兩　甘草半兩

右㕮咀每服三錢水一盞煎七分温服

機要大秦艽湯二四五 治中風外無六經之形證内無便溺之阻隔血弱不能養筋故手足不能運動舌强不能言語宜養血而筋自愈

當歸　芍藥　白术

生地　熟地　川芎

甘草　茯苓　防風

白芷　獨活　羌活

黃芩各七分 秦艽 石膏各一錢

細辛五分

春夏加知母一錢

水二鍾煎一鍾溫服○如遇天陰加生薑七片如心下痞加枳實五分○按此湯自河間東垣而下俱用為中風之要藥夫既無六經之外證而胡為用羌辛防芷等藥既內無便溺之阻隔而何用石膏秦艽黃芩之類其為風寒痛痺而血虛有火者乃宜此方耳

按卒養血當歸地黃湯 二四六 治中風少血偏枯筋脈拘攣疼痛

當歸　川芎　熟地黃

芍藥　藁本　防風

白芷 各一錢 細辛 五分

水一鍾半煎八分食遠溫服

薏苡仁湯 二四七 治中風流注手足疼痛麻痺不仁難以伸屈

薏苡仁　當歸　芍藥

麻黄　官桂　蒼术米泔浸切炒

甘草

水一鍾半生薑七片煎八分食前服○自汗去麻黄

有熱減官桂

滌痰湯二四八　治中風痰迷心竅舌強不能言

南星製　半夏泡七次各二錢半　枳實麩炒

茯苓各一錢　橘紅一錢半　石菖蒲

人參各一錢　竹茹七分　甘草五分

水一鍾半生薑五片煎八分食後服

清心散二四九　治風痰不開

青黛　硼砂　薄荷各二錢

牛黄　冰片各三分

右為細末先以蜜水洗舌後以薑汁擦舌將藥末蜜

水調稀搽舌本上

簡易虎骨散二百五十　治半身不遂肌肉乾瘦為偏枯

忌用麻黃發汗恐枯津液惟此方潤筋去風

當歸 烏蛇肉各二兩 赤芍藥

白朮 續斷 藁本

虎骨各一兩

右爲細末每服二錢食後溫酒調下○若骨中煩疼

加生地黃一兩○若臟寒自利加天雄半兩

虎骨散二五一 治風毒走注疼痛不定少得睡卧

虎脛骨醋炙 龜板醋炙各二兩 血竭另研

沒藥另研　自然銅醋焠　赤芍藥
當歸　蒼耳子炒　骨碎補去毛
防風各七錢半　牛膝酒浸　天麻
檳榔　五加皮　羌活各一兩
白附子炮　桂心　白芷各半兩
右為細末每服二錢溫酒調下不拘時
交加散二五二　治瘈瘲或戰振或産後不省人事口
吐痰涎

當歸 芥穗等分

右爲細末每服二錢水一鍾酒少許煎七分溫服神效

交加散 二五三 方在婦人百

良方

治經脈結聚不調腹中撮痛

四白丹 二五四 清肺氣養魄鬼以中風多昏胃氣

絜古

不清利也兼能下强骨髓

白术 白茯苓 人參

川芎　甘草　砂仁

香附　防風各半兩　白芷一兩

白檀香　藿香各錢半　知母

細辛各二錢　羌活　薄荷

獨活各二錢半　麝香一錢另研　牛黄

片腦各五分另研　甜竹葉

右為末煉蜜為丸每兩作十丸臨睡嚼一丸煎愈風

湯送下上清肺氣下強骨髓

續斷丹 二五五 治中風寒濕筋攣骨痛

續斷　萆薢酒浸　牛膝酒浸

乾木瓜　杜仲炒各二兩

右為末煉蜜和丸每兩作四丸每服一丸細嚼溫酒

下不拘時

濟生 豨薟丸 二五六 治中風口眼喎斜時吐涎沫語言

蹇澀手足緩弱

豨薟草　生於沃壤間帶猪氣者是

五月五日或六月六日採葉洗淨不拘多少九蒸九晒每蒸用酒蜜洒之蒸一飯頃九蒸畢日乾為末煉蜜丸桐子大每服百丸空心溫酒米飲任下

一方每稀薟草一斤加四物料各半兩川烏羌活防風各二錢丸服

蠲痺湯 二五七 治周痺及手足冷痺脚腿沉重或身體煩疼背項拘急

當歸 赤芍藥煨 黃芪

薑黃　羌活各錢半　甘草五分

水二鍾薑三片棗二枚不拘時服

三痺湯二五八　治血氣凝滯手足拘攣風痺等疾皆效

人參　黄芪　當歸

川芎　熟地黄　白芍藥

杜仲薑汁炒　續斷　桂心

牛膝　細辛　白茯苓

防風　秦艽　獨活

甘草 等分

水二鍾薑三片棗一枚煎七分不拘時服

加味五痺湯 二五九　治五臟痺證

人參　白芍藥 煨　茯苓

川芎 或倍之　當歸 各一錢　五味子 十五粒

細辛 七分　甘草 五分　白术 一錢脾痺倍用

水二鍾薑一片煎八分食遠服○肝痺加棗仁柴胡

○心痺加遠志茯神麥冬犀角○脾痺加厚朴枳實砂仁神麯○肺痺加紫菀半夏杏仁麻黄○腎痺加獨活官桂杜仲牛膝黄芪萆薢

人參散二百六十 治肝脾氣逆胸脇引痛眠卧多驚筋脈攣急此藥鎮肝去邪

人參二兩 杜仲炒 黄芪炙
棗仁微炒 茯神各一兩 五味子
細辛去苗 熟地黄 秦艽

羌活去蘆 芎藭 丹砂細研各半兩

右為細末入丹砂再研匀每服一錢不拘時溫酒調下日三服

六味茯苓湯二六一 治肢體手足麻痺多痰唾眩冒者

半夏製 赤茯苓 橘紅各二錢

枳殼麩炒 桔梗去蘆 甘草炙各一錢

水二鍾薑五片煎八分不拘時服

枳實散 二六二 治心痺胸中氣堅急心微痛氣短促
欬唾亦痛不能飲食

枳實 麩炒 桂心 細辛

桔梗 各七錢半 青皮 一兩

右㕮咀每服三錢水一鍾生薑一錢半煎六分不拘
時服

紫蘇子湯 二六三 治肺痺心胸滿塞上氣不下

紫蘇子 炒八兩 半夏 湯泡五兩 橘紅

桂心各三兩 人參 白术

甘草炙各二兩

右㕮咀每服四五錢水一鍾生薑五片棗二枚煎七

分不拘時溫服

除濕蠲痛湯二六四 治風濕痛痺

羌活 茯苓 澤瀉

白术各一錢半 陳皮一錢 甘草四分

蒼术米泔浸炒二錢

水二鍾煎八分入薑汁竹瀝各二三匙服○痛在上者加桂枝威靈仙桔梗○痛在下者加防巳木通黄蘗牛膝

桂心散二六五 治風邪走注疼痛

桂心　漏蘆　芎藭

威靈仙　白芷　當歸

木香　白殭蠶炒　地龍去土炒乾各半兩

右為細末每服二錢溫酒調下不拘時

溼鬱湯二六六　治雨露所襲或嵐氣所侵或坐卧溼地或汗出衣衫溼鬱其狀身重而痛倦怠嗜卧遇陰寒則發脉沉而細緩者是也

蒼朮三錢　白朮　香附

橘紅　厚朴薑汁炒　半夏製

白茯苓　撫芎　羌活

獨活各一錢　甘草五分

生薑五片水煎服

趂痛散 二六七

乳香　沒藥　桃仁

紅花　當歸　羌活

地龍酒炒　牛膝酒洗　甘草

香附童便洗　五靈脂酒炒

右為末每服二錢酒調服○或加酒炒芩蘗

秦艽地黃湯 二六八　治風熱血燥筋骨作痛

秦艽　生地黃　當歸

川芎　白芍藥　甘草

防風　荊芥　升麻

白芷　蔓荊子　大力子蒸

羌活各一錢

右水煎服

活絡飲二六九　治風濕痺痛諸藥不效

當歸　白术　川芎

羌活　獨活各一錢　甘草五分

水一鍾半薑五分煎七分溫服

寶鑑獨活寄生湯二百七十 治腎虛臥冷寒濕當風腰腳疼痛

獨活一錢　杜仲炒　細辛

桑寄生　人參　當歸

川芎　芍藥　茯苓

牛膝　甘草　桂心

熟地黃　防風　秦艽

水一鐘半薑三片煎七分空心服

透經解攣湯二七一　治風熱筋攣骨痛

穿山甲三錢泡　荆芥　紅花

蘇木　羌活　當歸

蟬退去土　防風　天麻

甘草各七分　白芷一錢　連翹

川芎各五分

右酒水各半煎服

熏蒸方二七二　治腎氣衰弱或肝脾腎三經受風寒濕氣停於腿膝經絡致成脚痺疼痛宜用此藥和榮衛通經絡是亦治痺之法

花椒一撮　葱三大莖切　鹽一把

小麥麸約四五升　酒一盞　醋不拘多少以拌前件至潤為度

右放銅器內炒令極熱攤卧褥下將患脚熏蒸其上益以衣被穩卧一時要汗出為度勿見風〇或加薑桂亦妙

薰洗痛風法二七三　治手足冷痛如虎咬者

右用樟木屑一斗以急流水一擔煮沸將樟木屑入大桶内用前湯泡之桶邊放一兀凳桶内安一矮凳令病人坐桶邊放脚在桶内外以草薦一領圍之勿令湯氣入眼恐致壞眼其功甚捷

愈風丹二七四　治足三陰虧損風邪所傷肢體麻木手足不隨等證

羌活十四兩　當歸　熟地

生地各一斤 杜仲七兩 天麻

萆薢另研細 牛膝酒浸焙乾 玄參各六兩

獨活五兩 肉桂三兩

煉蜜丸桐子大每服五七十丸或百丸空心食前溫

酒或白湯下

易老天麻丸二七五 治諸風肢節麻木手足不隨等證

天麻酒浸三日焙乾 牛膝製同前 萆薢另研末各六兩

當歸二十兩 附子製一兩 羌活十兩

生地一斤

丸服如前法○一方有玄參六兩杜仲七兩獨活五兩○按此方與前愈風丹大同但生地性凉恐滯經絡宜改用熟地為妥且以六十四兩之諸藥而佐以一兩之附子果能效否此最少亦宜四兩或六兩方可也

愈風燥濕化痰丸二七六 治歴節風濕痰壅滯晝夜疼痛無休者

白朮炒　蒼朮米泔浸　杜仲薑汁炒各二兩

牛膝酒浸　川芎　薏仁

巴戟　破故炒各一兩　當歸

牙皂瓦炒　防風　羌活

生地　獨活　防巳

天麻　南星　半夏

陳皮　木香　沉香

川烏　殭蠶　全蝎各五錢

右為末酒糊丸桐子大每服百丸空心食前酒送下日二次食乾物壓之

活絡丹二七七 治中風手足不用日久不愈經絡中有濕痰死血者

草烏泡去皮 川烏泡去皮臍 膽星各六兩 地龍去土焙乾 乳香去油 没藥各二兩二錢

蜜丸桐子大每服二三十丸温酒茶清任下

東垣開結導飲丸二七八 治飲食不消心下痞悶腿脚

腫痛

白术炒　陳皮炒　澤瀉

茯苓　神麴炒　麥芽炒

半夏製各一兩　枳實炒　青皮

乾薑各五錢　如有積塊者加巴霜錢半

為末湯浸蒸餅為丸梧子大每服四五丸或十丸温

水下此内傷飲食脾胃之氣不能運行上升則注為

脚氣故用此以導引行水化脾氣也

換骨丹二七九 通治諸風痺痛兼治鶴膝風○此與後史國公浸酒方大同

虎骨酥炙 防風 牛膝

當歸 羌活 獨活

敗龜板 秦艽 萆薢

晚蠶沙 松節各一兩 枸杞一兩半

茄根洗淨二兩

酒糊丸服或酒浸或為末服亦可

局方換腿丸 二百八十 治足三陰經爲風寒熱濕所侵發爲攣痺緃緩疼痛上攻胸脇下至脚膝足心發熱行步艱難

薏仁　南星　防巳

防風　石斛　檳榔

萆薢　石南葉　羌活

木瓜各四兩　牛膝酒浸　當歸

天麻　續斷各一兩　黄芪一兩半

右爲末酒糊丸梧子大每服五七十丸空心鹽酒下

史國公浸酒方二八一　一名萬病無憂酒○治諸風五痺左癱右瘓四肢頑麻口眼歪斜骨節痠疼諸般寒濕風氣效難盡述

當歸　鼈甲炙　羌活

萆薢　秦艽　防風去蘆

牛膝　晚蠶沙　松節

枸杞五兩　乾茄根八兩飯上蒸熟　虎脛骨酒浸一日焙乾酥炙

用無灰酒一斗絹袋盛藥入酒內封十日可服取飲時不可面向罈口恐藥氣衝人頭面飲酒不可間斷飲盡將藥查晒乾為末米糊丸桐子大空心酒下五十丸忌發風動氣等物

類方煨腎散二八二　治腰痛

人參　當歸　杜仲

肉蓯蓉　破故紙　巴戟

鹿角霜　秋石等分

為末用猪腰子一個洗淨血水淡鹽浥過劈開兩半勿令斷中間細細花開用前藥摻入另用稀絹包裹線縛定外用小砂罐入酒少許用紙封固毋令泄藥氣煮腰子候熟取食之仍飲醇酒三杯立愈

調榮活絡飲（二八三）治失力閃腰或跌撲瘀血及大便不通腰痛

當歸　牛膝　杏仁（研如泥）

大黄（各二錢）　生地　芍藥

紅花　羌活各一錢　桂枝三分

川芎一錢半

水一鍾半煎八分食前温服

胡桃湯二八四　治腎虛腰痛

胡桃肉　補骨脂　杜仲各四兩一作各四錢

右㕮咀分二貼用水二鍾煎七分空心服

良方雞鳴散二八五　治脚氣第一品藥不問男女皆可服如感風濕流注脚痛不可忍筋脉浮腫者並宜服

之其效如神

檳榔七枚 橘紅 木瓜各一兩

吳茱萸 蘇葉各二錢 桔梗去蘆

生薑連皮各半兩

右㕮咀用水三大碗慢火煎至一碗半取查再入水二碗煎取一小碗兩汁相和安置牀頭次日五更分作三五次冷服之冬月畧溫亦可服了用乾物壓下如服不盡留次日漸漸服之亦可服藥至天明當下

黑糞水即是腎家所感寒濕之毒氣也至早飯時必痛住腫消只宜遲喫飯使藥力作效此藥並無所忌

茱萸木瓜湯二八六　治脚氣衝心悶亂不識人手足脈欲絶

吳茱萸半兩　乾木瓜一兩　檳榔二兩

右㕮咀每服八錢水一鍾半生薑五片煎八分不拘時温服

立效散二八七　治脚氣攻心此方消腫甚效及治暴

腫

檳榔七枚　生薑二兩　陳皮

吳茱萸　紫蘇　木瓜各一兩

右水三升煎一升分作二服

丹溪防已飲二八八　治脚氣

白术　木通　防已

梹榔　川芎　甘草稍

犀角　蒼术鹽水炒　生地黄

黄栢酒炒等分

右水煎服○大便實加桃仁○小便澁加牛膝○有熱加黄芩黄連○大熱及時令熱加石膏○有痰加竹瀝薑汁

紫蘇散二八九 治脚氣上氣心胸壅悶不得眠卧

蘇葉　桑白皮　赤茯苓

檳榔　木瓜各一兩　炙甘草

紫菀　前胡去蘆　杏仁去皮尖

百合各七錢

右㕮咀每服八錢水一鍾半生薑五片煎八分不拘時溫服

三因紫蘇湯二百九十 治脚氣陰陽交錯上重下虛中滿喘急嘔吐自汗

蘇子炒 半夏製各一錢 前胡

厚朴薑汁炒 甘草炒 歸身各七分

陳皮 肉桂各四分

水一鍾半薑三片煎七分不拘時服

濟生檳榔湯二二九 治一切脚氣散氣疏壅

檳榔　香附　陳皮

蘇葉　木瓜　五加皮

甘草炙各七分

右㕮咀水一鍾半生薑三片煎服

加減檳榔湯二九二 治一切脚氣脚弱名曰壅疾貴在疏通春夏尤宜服之

檳榔　橘紅　蘇葉各一兩

甘草炙半兩

右每服五七錢水一鍾半生薑五片煎八分不拘時

温服○如脚痛不已者加木香五加皮○婦人脚痛

加當歸○室女脚痛多是肝血滯實宜加赤芍藥○

中滿不食加枳實○痰厥或吐加半夏○腹痛大便

不通用此湯下青木香丸或加大黄○小便不利加

木通○轉筋者加呉茱萸○脚腫而痛者加大腹皮

木瓜○脚氣痛而熱加地骨皮

檳榔散 二九三 治脚氣衝心煩悶不識人

檳榔 茴香 木香各半兩

右㕮咀每服五錢以童便一鍾煎七分不拘時温服

活人桑白皮散 二九四 治脚氣盛發上氣喘促兩脚浮腫小便赤澁腹脇脹滿氣急坐卧不得

桑白皮 郁李仁各一兩 赤茯苓二兩

木香 防已 大腹子各一兩半

蘇子　木通　檳榔

青皮各七錢半

右每服三五錢薑三片水煎服

木香散二九五　治脚氣衝心煩悶臍下氣滯

木香半兩　檳榔　木通各一兩

右㕮咀每服八錢水一鍾半生薑五片葱白七寸煎八分不拘時溫服

木通散二九六　治脚氣遍身腫滿喘促煩悶

木通去皮　蘇葉　猪苓各一兩
桑白皮　赤茯苓　檳榔各二兩
右㕮咀每服五七錢水一鍾半生薑五片葱白七寸
煎一鍾不拘時溫服
人參桂心散二九七　治脚氣嘔逆心煩不能飲食
人參去蘆　赤茯苓　檳榔
麥門冬　橘紅各一兩　桂心七錢半
右㕮咀每用八錢水一鍾半加生薑七片煎服

橘皮湯二九八 治脚氣痰壅嘔逆心胸滿悶不思飲食

橘紅 人參去蘆 蘇葉各一兩

右㕮咀每服八錢水一鍾半生薑五片煎一鍾不拘時溫服

集驗半夏散二九九 治脚氣煩悶嘔逆心胸壅悶不能飲食

半夏泡七次切 桂心各七錢半 赤茯苓

人參去蘆 橘紅 前胡去蘆

檳榔各一兩　蘇葉一兩半

右㕮咀每服五七錢水一鍾半生薑七片淡竹茹二錢煎七分温服無時

大腹皮散　三百　治諸脚氣浮腫心腹痞悶小便不利

大腹皮三兩　木瓜　蘇子

檳榔　荆芥穗　烏藥

橘紅　蘇葉各一兩　蘿蔔子半兩

沉香　枳殼麩炒　桑白皮各兩半

右㕮咀每服八錢水一鍾半薑五片煎八分温服○

御醫藥方加木通白茯苓炒茴香炙甘草四味即名

沉香大腹皮散

大腹子散（活人）三百一　治風毒脚氣肢節煩疼心神壅

悶

大腹子　紫蘇　木通

桑白皮　羌活　木瓜

荆芥　赤芍藥　青皮

獨活各一兩　枳殼二兩

右每服四錢水一盞薑五片葱白七寸煎空心溫服

地黃湯三百二　治穿心脚氣

熟地黃四兩　當歸二兩　芍藥

川芎　牛膝酒浸　三柰各一兩

杜仲半兩薑汁炒

右㕮咀每服一兩水一鍾半煎八分不拘時溫服

木瓜湯三百三　治脚氣

木瓜　大腹皮　紫蘇

木香　羌活　炙甘草各一錢

茯苓　陳皮各八分

水一鍾半煎八分食前服

沉香湯三百四 治邪氣攻心煩悶氣促脚瘦疼

沉香　木通　檳榔各五分

吳茱萸三分　赤芍藥一錢半　紫蘇一錢

水一鍾半生薑三片煎八分不拘時溫服

續斷丸 三百五 治風濕流注四肢浮腫肌肉麻痺

川續斷　當歸　萆薢

附子　防風　天麻各一兩

乳香　沒藥各半兩　川芎七錢半

右爲細末煉蜜丸桐子大每服四十丸空心溫酒或米飲下

本事續斷丸 三百六 治肝腎風寒氣弱脚不可踐地脚膂疼痛風毒流注下部行止艱難小便餘瀝此藥補

五臟内傷調中益氣涼血强筋骨

杜仲五兩　五加皮　防風

薏仁　羌活　續斷

牛膝酒浸各三兩　萆薢四兩　生地黄五兩

右為末用好酒三升化青鹽三兩用木爪半斤去皮子以前鹽酒煮成膏和藥為梧子大每服五七十丸空心食前溫酒鹽湯任下

保命牛膝丸三百七　治腎肝虛損骨痿不能起於牀筋

弱不能收持宜益精緩中

牛膝酒浸　萆薢　杜仲炒

白蒺藜　防風　兎絲子酒煮

肉蓯蓉酒浸等分　官桂減半

右為末酒煮猪腰子搗和丸桐子大每服五七十丸

空心溫酒送下

本事酒浸牛膝丸三百八　治腰脚筋骨痠軟無力

牛膝三兩炙黄　川椒去合口者　虎骨真者醋炙黄各半兩

附子一枚炮去皮臍

右㕮咀用生絹作袋盛藥以煮酒一斗春秋浸十日夏七日冬十四日每日空心飲一大盞酒盡出藥為末醋糊丸每服二三十丸空心溫酒鹽湯任下忌動風等物

茱萸丸三百丸　治脚氣入腹喘急欲死

吳茱萸泡　木瓜等分

右為末酒糊丸梧子大每服五七十丸至百丸空心

酒飲任下○或以木瓜蒸爛研膏丸服尤妙　此方内加大黄名三將軍丸

東垣健步丸三百十　治脚膝無力屈伸不得腰背腿脚沉重行步艱難

防已酒洗一兩　羌活　柴胡

滑石炒　炙甘草　天花粉酒洗各五錢

防風　澤瀉各三錢　苦參酒洗

川烏各一錢　肉桂五分

右為細末酒糊丸桐子大每服七八十丸煎愈風湯空心送下

調元健步丸　三十一　治陰虛血少濕熱兼行足履無力

當歸 酒洗　川黃柏 鹽酒炒　枸杞 各二兩

牛膝 三兩鹽酒浸　芍藥 微炒　白茯苓

白朮 炒　蒼朮　陳皮 各一兩

炙甘草 三錢　木瓜　五加皮 各八錢

續斷七錢　澤瀉　防巳各五錢

蜜丸桐子大空心鹽湯送下七八十丸或百丸

三因勝駿丸三一二　治元氣不足為寒濕之氣所襲腰足攣拳或脚面連指走痛無定筋脉不伸行步不隨常服益真氣壯筋骨

附子炮製　當歸　天麻

牛膝　木香　棗仁炒

熟地酒蒸　防風各二兩　木瓜四兩

羌活　乳香各半兩　全蝎炒

甘草炙　没藥各一兩　麝香二錢

右為末用生地黄三斤以無灰酒四升煑乾晒二日杵爛如膏入前末和匀杵千餘下每兩作十丸每服一二丸細嚼臨卧酒下作小丸服亦可

神應養真丹三一三　治厥陰經為四氣所襲脚膝無力或右癱左瘓半身不遂手足頑麻語言蹇澁氣血凝滞遍身疼痛

當歸酒浸片時搗 熟地黄酒蒸搗 川芎

芍藥 羌活 天麻

兎絲子酒製 木瓜等分

右爲末入地黄當歸二膏加蜜搗丸桐子大每服百丸空心酒下鹽湯亦可

透骨丹三一四 專治脚氣

川烏炮 羌活 沉香

乳香另研 川芎 檳榔

木瓜各一兩　木香一兩半　白茯苓二兩

右為末麪糊丸梧子大食前薑湯下六七十丸

本事　虎骨酒三一五　去風補血益氣壯筋骨强脚力

虎脛骨真者　萆薢　仙靈脾

薏苡仁　牛膝　熟地黄各二兩

右剉細絹袋盛浸酒二斗飲了一盞入一盞可得百

日婦人去牛膝

活人　薏仁酒三一六　治脚痺

薏苡仁　牛膝各二兩　海桐皮
五加皮　獨活　防風
杜仲各一兩　熟地黄一兩半　白术半兩
右為粗末以生絹袋盛用好酒五升浸春秋冬二七
日夏月分作數貼逐貼浸酒用之每日空心温服一
盞或半盞日三四服常令酒氣不絶久服覺皮膚下
如有蟲行即風濕氣散
椒艾囊三一七　治脚氣極效及避一切脚氣風氣毒

氣

艾葉揉半斤 川椒一斤淨 草烏二兩為粗末

右三味和勻用布袱鋪如綿褥裹足底及足脛即用火踏下加微火烘踏於上使椒艾之氣得行於足自然寒濕風毒諸氣皆得消散立能止痛痛止後仍要三二日一為之或夜臥包之達旦去之用此方法無不效者

丹溪敷脚氣方 三一八 治脚氣腫痛

芥菜子 白芷等分

右為末薑汁和敷痛處

蕪荑散三一九 治大人小兒蚘咬心痛不可忍或吐青黃綠水涎沫或吐蟲出發有休止此蚘心痛也宜此主之

蕪荑 雷丸各半兩 乾漆槌碎炒大烟盡一兩

右為細末每服三錢用溫水七分鍾調和服不拘時甚者不過三服小兒每服五分

直指蕪荑散三百二十 取諸蟲

雞心檳榔 蕪荑各三錢 木香一錢

右為末作一服先以酸石榴根煎湯俟五更時乃嚼炙肉引蟲頭向上然後以石榴根湯調藥温服蟲自軟困而下

榧子煎三二一 治寸白蟲化為水

細榧子四十九枚去殼

以砂糖水半盞用砂鍋煮乾熟食之每月上旬平旦

空心服七枚七日服盡蟲化為水永瘥○一方以百枚食盡佳不能食者盡五十枚經宿蟲消自下并治三蟲神效方也

聖效方 三二二 治寸白蟲神效

檳榔 半兩 南木香 二錢

右為細末每服三錢濃米飲調下須五更空心先嚼炙肉只嚥汁下咽吐其肉隨即服藥巳閒當蟲下盡去病根此方簡易屢驗

仲景烏梅丸 三二三 治胃寒吐蚘蚘厥等證

烏梅肉三十個 人參 黄栢炙

細辛 附子炮 桂枝各六錢

黄連炒一兩六錢 乾薑一兩 當歸酒浸

川椒去目及閉口者各四錢撮要作各四兩

右研末先將烏梅用酒蒸爛擣膏加煉蜜丸桐子大每服一二十丸日三服忌生冷滑物或用理中湯下

○成無已曰肺欲收急食酸以收之烏梅之酸以收

肺氣脾欲緩急食甘以緩之人參之甘以緩脾氣寒淫於內以辛潤之當歸桂椒細辛之辛以潤內寒寒淫所勝平以辛熱薑附之辛熱以勝寒蚘得甘則動得苦則安黃連黃栢之苦以安蚘

濟生 烏梅丸 三二四　方在固陣六十

治大便下血

神授散 三二五　方在因陣二五五

治傳尸癆蟲

寶鑑川楝散三二六　治諸疝小腸氣

木香　小茴香鹽炒各一兩　川楝子一兩用巴豆十五粒打破用炒黄去巴豆不用

右為末空心酒下二錢

荔核散三二七　治疝氣陰核腫大痛不可忍

大茴香炒　沉香　木香

青鹽　食鹽各一錢　川楝肉

小茴香各二錢　荔枝核十四枚用新者燒焦裂

右為細末每三錢食前熱酒調服

經驗蒼术散 三二八 治下元虛損偏墜腎莖痛楚

真茅山蒼术六斤 分六製 〇一斤用老米泔水浸二日夜〇一斤酒浸二日切片晒乾〇一斤用斗子青鹽半斤同炒黄色不用鹽〇一斤小茴香四兩同炒黄色去茴香不用〇一斤用大茴香四兩同炒如前〇一斤桑椹二斤取汁拌製晒乾

右為細末每服三錢空心酒下

寶鑑大台烏藥散 二二九 治小腸疝氣卒引臍腹疼痛

烏藥 木香 茴香炒

良薑炒 青皮各半兩 檳榔二個

川楝子十個 巴豆七十粒

右將巴豆微打破同川楝子加麩炒黑去麩及巴豆不用其餘共為細末每服一錢溫酒下甚者薑酒下

百選桃仁膏 三百三十 治氣血凝滯疝氣膀胱小腸氣痛不可忍

桃仁炒去皮尖　大茴香炒

右等分為末每服二錢葱白二寸煨熟蘸藥細嚼空心熱酒下

局方守效丸三三一　治癩疝不痛者之要藥

蒼朮　南星　白芷

川芎　山查　半夏

枳實一云橘核

右等分為末薑汁糊丸桐子大每服七八十丸鹽湯

下○有寒加吴茱萸○有熱加山梔子○又或加青

皮荔枝核

來復丹 三三二 治伏暑泄瀉裏寒外熱其效如神及

治諸腹痛疝氣小兒驚風

硝石一兩同硫黄為末入磁碟内用微火炒以柳枝攪結砂子火不可大恐傷藥力再研極細名二氣末

舶上硫黄一兩 五靈脂砂澄去

橘紅 青皮各二兩一作各二錢

太陰玄精石各一兩

右為末醋糊丸豌豆大每服三十丸空心米飲下○伏暑悶亂紫蘇湯下○大人疝氣諸痛悉宜服之○小兒驚風欲絶研碎米湯下

衛生潤腸湯 三三三 治大便燥結不通

生地黃 生甘草 熟地黃

當歸尾 大黃煨各五錢 桃仁

麻子仁各一錢 紅花

右用水二盞煎一盞空心服

通幽湯 三三四 治大便燥結堅黑腹痛

熟地 生地 歸稍

紅花 桃仁泥 大黄 各一錢

升麻 二分

水一鍾半煎服○古方加麻仁甘草即名潤燥湯

東垣導滯通幽湯 三三五 治幽門不通氣不升降大便閉塞凡脾胃初受熱中多有此證治在幽門以辛潤之

升麻稍　桃仁泥　歸身各一錢
炙甘草　紅花各三分　熟地
生地各五分
水二鍾煎一鍾調檳榔末五分稍熱服
河間厚朴湯三三六　治大便氣秘不通不能飲食小便
清利者謂之虛秘此湯主之盖實秘者物也虛秘者
氣也
厚朴一錢半　白术二錢　半夏

枳殼　陳皮　甘草各一錢

水一鍾半薑三片棗三枚煎八分食遠服○如不通

加大黄一錢

會編皂角散　三三七　治大小便閼格不通經三五日者

大皂角燒存性

右為末米湯調下○又以猪脂一兩煮熟以汁及脂

俱食之○又宜以八正散加檳榔枳殼朴硝桃仁燈

心茶葉煎服

良方 三仁丸 三三八 治大腸有熱津液竭燥大便澁

柏子仁 松子仁 火麻仁各一兩

右研勻用黃蠟半兩溶化和丸桐子大每服二十丸食前米飲下未快加數服之

脾約丸 三三九 方在攻陣九三

通大便秘結

東垣 潤腸丸 三百四十 治胃中伏火大便秘澁不通不思飲食或風結血秘皆須潤燥和血疏風則自通矣

歸稍 大黄煨 羌活各五錢

麻仁 桃仁去皮尖各一兩

右以二仁另研為泥外為細末煉蜜為丸桐子大每服三五十丸空心白湯送下○一方有皂角仁秦艽各五錢

濟生蓯蓉潤腸丸三四一 治發汗利小便致亡津液大腑秘結老人虛人宜服

肉蓯蓉酒浸焙二兩 沉香一兩另研

右為末取麻子仁搗爛和水取汁打糊丸桐子大每服七八十丸空心米飲或酒送下

益血潤腸丸 三四一 治老人大便燥結

熟地黃六兩 杏仁炒去皮尖 麻仁各三兩以上三味同杵膏

枳殼麸炒 橘紅各二兩 肉蓯蓉酒洗去甲

阿膠炒各一兩 蘇子 荊芥各一兩

當歸三兩

右以後七味為末同前三味膏和杵千餘下仍加煉

蜜丸桐子大每服五六十丸空心白湯或酒下

搜風順氣丸 三四三 治痔漏風熱閉結老人燥秘等

證

車前子 兩半 大麻子 微炒二錢 大黄 五錢半生半熟

牛膝 酒浸 郁李仁 兎絲子 酒浸

枳殻 山藥 各二錢

右為末煉蜜丸桐子大每服三十丸溫酒下

聖惠搜風順氣丸 三四四 治風氣脚氣丸老人小兒血

熱風熱而大便秘結者宜服

車前子兩半　大麻仁微炒去殼　郁李仁泡去皮

兎絲子酒浸煮　牛膝酒浸一宿　乾山藥各一兩

白檳榔一兩　枳殼麸炒　防風

獨活各八錢　大黄五錢半生半熟

煉蜜丸小豆大茶酒湯任下早晚各一服

地髓湯三四五　治死血作淋痛不可忍及五淋小便不通莖中痛甚欲死○一名牛膝又名苦杖散

牛膝不拘多少

或用一兩搥碎以水二鍾煎濃汁一鍾去查日三服

○又法入麝香少許空心服或單以酒煎亦可

牛膝膏三四六 治死血作淋

桃仁去皮尖 歸尾酒洗各一兩 生地黄酒洗

赤芍藥各兩半 川芎五錢 牛膝去蘆四兩酒浸一宿

右㕮咀用好水十鍾炭火慢煎至二鍾入麝香少許分四次空心服如夏月須用冷水換浸之則不壞

經驗琥珀散 三四七 治老人虛人小便不通淋澁

琥珀為末 人參煎湯

空心以人參湯調服琥珀末一錢

導赤散 三四八 方在寒陣一二二

利小腸熱澀

萬全木通湯 三四九 治小便難而黄

木通 赤茯苓 車前葉

滑石各二錢 瞿麥一錢

水一鍾半煎七分食前服

葱白湯 三百五十 治小便卒暴不通小腹脹急氣上衝心悶絶欲死此由暴氣乘膀胱或因驚憂氣無所伸衝逆胞系鬱閉不流

陳皮 三兩 葵子 一兩 葱白 三莖

右㕮咀用水五升煮取二升分三服○一云每服五錢葱白三莖水煎服

 清肺飲子 三五一 治渴而小便不利邪熱在上焦

氣分也

茯苓　猪苓　澤瀉各一錢半

車前子　琥珀　木通

瞿麥　萹蓄各一錢　通草

燈心各五分

水二鍾煎一鍾食遠服

半夏丸三五二　治濕痰流注白濁神效

半夏製　猪苓等分

右為末神麯糊丸服○按此方與本事猪苓丸同意

詳固陣四十八

良方 醍醐膏 三五三 治消渴

白砂蜜五斤　砂仁為末半兩　烏梅一斤杵碎用水四大碗煎一碗去查

右入砂鍋慢火熬赤色成膏取下放冷加白檀細末三錢麝香一字攪匀以磁器收貯密封冬月沸湯調服夏月涼水亦可

無擇 養勞湯 三五四 治五疸虛弱脚軟心悸口淡耳鳴微

發寒熱氣急小便白濁當作虛勞治之

人參　黃芪　白术

當歸　甘草炙　桂心

陳皮各一兩　白芍藥三兩　生地黃

茯苓各五錢　五味子　遠志各三錢

右㕮咀每服一兩水一鍾半薑三片棗三枚煎七分食

前服

綠礬散三五五　治黃胖

綠礬六兩以米醋於鐵杓内灼七次乾為度放地上出火氣　南星炒黄色

神麯一兩炒黄色　大皂角一斤鐵鍋水煮爛揉出聳膠淨汁入鍋入棗肉再熬成膠

和藥紅棗六兩蒸去皮核入皂角汁内熬膠

右前三味為細末以皂角棗膠擣丸桐子大每服五丸侵晨下牀時用薑湯下夜臥上牀時再服五丸忌油膩煎炒如身上發紅斑急煎棗湯解之自愈

簡易濟衆方　三五六　治心氣不寧怔忡驚悸清上膈風

熱痰飲

白石英　朱砂等分

右為細末每服五分金銀湯調下

抱膽丸三五七　治男婦一切癲癇風狂或因驚恐畏怖所致及婦人産後驚氣入心幷室女經脉通時驚邪蘊結氣實上盛者累效

水銀二兩　黒鉛一兩半　朱砂細研

乳香一兩細研各

右將黒鉛入銚子内溶化下水銀結成砂子次下朱

砂乳香乘熱用柳木槌研勻丸雞豆子大每服一丸空心井花水呑下病者得睡切莫驚動覺來即安再一丸可除根

靈苑辰砂散三五八 治風痰諸癇狂言妄走精神恍惚思慮迷亂乍歌乍哭飲食失常疾發仆地吐沫戴眼魂魄不守

辰砂光明佳者一兩 棗仁微炒 乳香明者各半兩

右為細末先令病人隨量恣飲沉醉但勿令吐居靜

室中將前藥都作一服用溫酒一鍾調匀令頓飲之如量淺者但隨量取醉服藥訖便令安臥病淺者半日至一日病深者臥三兩日只令家人潛伺之察其鼻息匀調切勿喚覺亦不可驚觸使覺必待其自醒即神魂定矣萬一驚寤則不可復治吳正肅公少時心病服此一劑五日方寤遂瘥

歸神丹 三五九 治五癇諸風痰壅驚悸神不守舍

人參 當歸 棗仁

白茯苓各二兩　米砂大塊者　琥珀
遠志薑湯製　龍齒各一兩　金箔
銀箔各二十片
右為末酒糊丸桐子大每服三五十丸麥門冬湯下
得效寧志丸三百六十　治心風癲癎服此一料其病頓
減
朱砂佳者一兩　人參　白茯苓
當歸　石菖蒲　乳香另研

棗仁浸去皮取仁炒香熟各五錢

右將朱砂用熟絹一小片包裹線紥以豮猪心一枚竹刀切開紙拭去血入朱砂包定再用線縛外以竹箬重裹麻皮紥緊用無灰酒二升同入砂罐煮酒盡取出朱砂另研將猪心用竹刀細切砂盆内研爛拌入藥末再加煮熟淨棗肉四兩搗丸桐子大留少朱砂為衣每服五七十丸人參湯下

人參琥珀丸 三六 治癲癇

人參　琥珀另研　茯神
白茯苓　石菖蒲小暑　遠志酒浸各半兩
乳香另研　朱砂水飛　棗仁温酒浸半日去殼紙上炒香各二錢半
右為末煉蜜丸桐子大每服三五十丸食後温酒送下日再服如不能飲者棗湯下此可常服
集驗秘方半夏丸三六二　治心風癲狂○張德明傳其内人失心狂數年服此藥而愈後再作服人參琥珀丸而安

半夏一兩用生薑汁煮三五十沸取出切作塊更煮令熟焙乾為末 麝香一錢研
水銀半兩 生薄荷一大握用水銀研如泥
右藥同薄荷泥更研千百下丸如芥子每服十五丸
金銀湯臨卧服三日再服
神應丹三六三 治諸癇
辰砂佳者不拘多少
右研細猪心血和匀以蒸餅裹劑蒸熟就熱取出丸
桐子大每服一丸人參湯下食後臨卧服

楊氏五癎神應丸 三六四 治癲癎潮發不問新久

白附子 泡半兩 半夏 二兩湯洗 南星

烏蛇 酒浸 白礬 生各一兩 全蝎 炒二錢

蜈蚣 半條 白殭蠶 炒一兩半 麝香 三字研

皂角 二兩槌碎用水半升挼汁去查同白礬一處熬乾為度研

硃砂 飛二錢半

右為細末生薑汁煮麪糊為丸桐子大每服三十丸

生薑湯食後送下

局方牛黃清心丸 三六五 治心志不定神氣不寧驚恐癲狂語言譫妄虛煩少睡甚至棄衣登高踰垣上屋或小兒風痰上壅抽搐發熱或急驚痰盛發搐目反口噤煩躁等證

白朮 麥門冬 枯黃芩各一兩半

人參 神麯 蒲黃炒各二兩半

山藥七兩 炙甘草五兩 杏仁去皮尖炒黃色另研

桔梗各二兩二錢 天豆黃卷微炒 當歸

肉桂各一兩七錢　阿膠　白蘞各七錢半

白茯苓一兩二錢　川芎　防風

麝香　冰片各五錢　羚羊角鎊一兩

犀角鎊二兩　雄黃八錢飛　乾薑炮七錢

大棗百枚蒸熟去皮研膏　金箔一千四百張內四百為衣

右另研為末煉蜜與棗杵勻每兩作十丸用金箔為衣每服一丸溫水化下

牛黃丸三六六　治癲狂風癇心風神不守舍時發

無常仆地吐涎不自知覺

牛黃 珍珠 麝香各五分

朱砂 龍齒各另研 犀角

琥珀各二錢 天門冬去心 麥門冬去心

人參 茯苓各四錢 水銀五分

防風 黃芩 知母

龍膽草 石菖蒲 白芍藥

全蝎 甘草各五錢 蜂房三錢

金箔 銀箔各七十片

右為細末共和匀煉蜜和擣千杵丸如梧桐子大每服十五丸食後臨臥新竹葉湯下

萬氏牛黄清心丸 三六七 方在小兒九四

治心熱神昏

錢氏牛黄丸 三六八 方在小兒九二

治小兒痰涎風癇

雜著牛黄丸 三六九 方在小兒九三

治小兒驚癇痰涎壅盛

三味牛黃丸 三百七十 方在小兒九五

治小兒驚熱疳積

蘇合香丸 三七一 治中氣或卒暴氣逆心痛鬼魅惡

氣等證

麝香 沉香 丁香

白檀香 香附 蓽撥

白朮 訶子 煨去皮 硃砂 水飛

青木香　烏犀角各一兩　薰陸香

龍腦各一兩　安息香二兩另為末用無灰酒一升熬膏

蘇合油二兩入安息香膏內

右為細末用安息膏并煉蜜每兩作十丸熔黃蠟包裹為善每用溫水化服一丸或丸如桐子大每服四五丸

龍腦雞蘇丸三七二　治上焦之火除煩解勞安吐血衄血清五臟虛煩神志不定上而酒毒膈熱消渴下

而血滯五淋血崩等疾

麥冬四兩　甘草一兩半　龍膽薄荷葉一斤

阿膠炒　人參各二兩　黃芪炙一兩

生地六兩另為末　木通　銀柴胡各二兩此二味用沸湯浸一日夜絞取汁

右用好白蜜二斤先煎一兩沸却入地黃末不住手攪徐加木通柴胡汁慢火熬成膏然後加前諸藥末和丸如豌豆大每服二十丸隨證用引送下○如室

女虚勞寒熱潮作用人參柴胡湯下○一方如前有

黄連一兩

九還金液丹三七三　方在小兒八八

治男婦小兒中風驚風痰盛氣急

香橘湯三七四　良方　治七情内傷胸膈不快腹脇脹痛

香附炒　半夏製　橘紅各三錢

甘草炙一錢

水一鍾半生薑五片紅棗二枚煎八分食遠服

良方 分氣紫蘇飲 三七五 治腹脇疼痛氣促喘息

蘇葉 桔梗去蘆 桑白皮

草果仁 大腹皮 白茯苓

陳皮 炙甘草各一錢半

水一鍾半生薑三片入鹽少許煎八分食前服

本事 枳實散 二七六 治男子兩脇疼痛

枳實一兩 白芍藥炒 雀腦芎

人參各半兩

右為細末薑棗湯調服二錢酒亦可食前日三服

濟生推氣散 三七七 治右脇疼痛脹滿不食

片薑黄 枳殻麩炒 桂心各五錢

甘草炙二錢

右為細末每服二錢薑棗湯食遠調服

白术丸 三七八 治息積病脇下滿悶喘息不安呼吸引痛不可鍼灸宜導引服此藥


白术炒 枳實麩炒 官桂各一兩半

人參二兩　陳皮　桔梗醋炒

炙甘草各一兩

右為細末煉蜜丸如桐子大每服五七十丸不拘時

溫酒送下日三服



景岳全書卷五十四